

อินซูลิน ลิสปโร**ความแรง 100 ยูนิต ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Lyumjev Kwikpen
(ลุมเจฟ ควิกเพิน)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า อินซูลิน ลิสปโร (Insulin Lispro) มีตัวยา 100 ยูนิต เป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ำตาลในเลือด (Antidiabetic group)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ขณะอยู่ในภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยสังเกตจากอาการเหนื่อยง่าย หัวใจเต้นแรง กระวนกระวาย รู้สึกไม่สบาย ปวดศีรษะ เหงื่อออก
 - มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยสังเกตจากอาการกระหายน้ำ ปวดศีรษะ ง่วงนอน บัสสาวะบ่อย

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร ที่นั่น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ห้ามฉีดยาด้วยตัวเองหากยังไม่ผ่านการฝึกฉีดยา

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดตามระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้ยาหรือไม่ และกลับมาใช้ยาตามปกติในมือถัดไป

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- อาจเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด (เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นแรง กระวนกระวาย รู้สึกไม่สบาย ปวดศีรษะ เหงื่อออก) ควรดื่มน้ำหวานหรืออมลูกอม หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามใช้ยานี้หากพบปากกาชำรุดหรือยาชุนหรือมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่
- ไม่ควรหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน
- ห้ามทิ้งยาผ่านทางท่อน้ำเสียหรือถังขยะในครัวเรือน สอบถามแพทย์ พยาบาลหรือ เภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้
- เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งก่อนที่จะฉีดยาครั้งต่อไป

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนงอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

**“หากเกิดอาการดังกล่าว
ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- บริเวณที่ฉีดยา มีอาการปวด บวม แดง ช้ำ
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ชีพจรเต้นเร็ว หายใจแรง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- หากยังไม่เปิดใช้ยา เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา โดยเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ภายหลังจากการใช้ยาครั้งแรก สามารถวางยาไว้นอกตู้เย็นได้นาน 28 วัน ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หากยาไม่ได้เก็บไว้ในสภาวะดังกล่าวให้ทิ้งยานั้นไป
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ปากกาฉีดยาชนิดพร้อมใช้ บรรจุสารละลายปราศจากเชื้อใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** อินซูลิน ลิสปโร (Insulin Lispro)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ไตแก๊ท ทรีโพสทรินิล โซเดียม, โซเดียม ซิเตรท ไดไฮเดรท, ซิงค์ ออกไซด์, แมกนีเซียม คลอไรด์ แสกาโซไฮเดรท, เมทาคลีซอล, กลีเซอรอล, ไฮดรอกซีคลอริก เอซิด, โซเดียม ไฮดรอกไซด์ และ น้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต บริษัท อีไล ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

22 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**