

**วิตามินซี 500 มิลลิกรัม
วิตามินดีสาม 400 หน่วยสากล
และสังกะสี 15 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Immuneze (อิมมูนิส)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาผสม ประกอบด้วย วิตามินซี วิตามินดีสาม และสังกะสี เป็นยาในกลุ่มวิตามินและเกลือแร่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาหรือป้องกันการขาดวิตามินซี วิตามินดี และสังกะสี

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีภาวะออกซาเลตในปัสสาวะสูง
- ⊗ มีภาวะที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการสะสมธาตุเหล็ก (เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, ภาวะเหล็กเกิน, โรคโลหิตจางไขเดอโรบลาสติก) หรือรับประทานยาที่อาจทำให้เหล็กเกิน
- ⊗ มีภาวะวิตามินดีเกิน
- ⊗ เป็นโรคนิ้วในไต
- ⊗ มีภาวะแคลเซียมในเลือด และ/หรือในปัสสาวะสูง
- ⊗ มีความผิดปกติของไตระดับรุนแรง
- ⊗ มีภาวะขาดทองแดง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท้องหรือวางแผนที่จะท้อง
 - อยู่ในระยะให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามินซี วิตามินดี สังกะสี หรือแคลเซียม
 - ต้องเข้ารับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ เนื่องจากอาจรับกวนการวิเคราะห์
 - มีภาวะไตวายหรือมีความเสียหายของไต
 - ผู้ที่เป็นโรคซาร์คอยโดซิส

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 4 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง
- เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้มื้อถัดไปให้รอกินตามปกติ **ไม่ต้อง** กินเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุ
- ห้ามใช้ยานี้หากยามีลักษณะเปลี่ยนไป
- ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
- ให้ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปัสสาวะมากขึ้น ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีผื่นคัน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นจากแสงแดด
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ด สีขาว รูปรี เคลือบฟิล์ม
- **ตัวยาสําคัญ** วิตามินซี 500 มิลลิกรัม วิตามินดีสาม 400 หน่วยสากล และสังกะสี 15 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไบโคริสตลลินเซลลูโลส, ครอสโพรโอดิน, ซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, โอปาโด รายทวิท์ 85G58923

ผู้ผลิต:

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:
10 ตุลาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**