

โลเพอราไมด์
ความแรง 2 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า Imodium® (อิโมเดียม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โลเพอราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์
(Loperamide hydrochloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องร่วงเฉียบพลันหรือ
อาการท้องร่วงเรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ⊗ ห้ามใช้กับผู้สูงอายุ
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคบิด โดยสังเกตจากการถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปน ร่วมกับมีไข้สูง
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่ท้องร่วงรุนแรงจากการกินยาต้านเชื้อแบคทีเรีย
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตสำไส้อักเสบ
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่ท้องผูก หรือท้องอืด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข:

1. ห้ามใช้ในเด็กและคนชรา

2. หลังจากใช้รักษาโรคท้องร่วงชนิดเฉียบพลันเกิน
48 ชั่วโมงไปแล้วและอาการไม่ดีขึ้นให้หยุดยา
และปรึกษาแพทย์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์
 - เป็นผู้ป่วยโรคตับ
 - ท้องร่วงมากกว่า 48 ชั่วโมง
 - ท้องร่วงรุนแรง
 - แพ้น้ำตาลนม (แลคโตส) เนื่องจากตัวยามีส่วนผสมของแลคโตส
- กำลังตั้งท้อง
- กำลังให้นมลูก
- กำลังใช้ยากลุ่มต่อไปนี้
 - ยาต้านไวรัสเอชไอวี
 - ยารักษาโรคหัวใจ
 - ยารักษาเชื้อรา
 - ยาลดไขมันในเลือด

เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาเวลาใดก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องกินยาเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยาแล้ว อาการท้องร่วงยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ เพราะยานี้เพียงแต่ทำให้จำนวนครั้งของการถ่ายลดลง แต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของอาการท้องร่วง
- หากใช้ยาแล้ว ท้องผูก ท้องอืด ให้หยุดยาทันที
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะท่านอาจอ่อนแรงจากอาการท้องร่วงและยาอาจทำให้มีอาการง่วงซึม หรือเวียนศีรษะ
- ควรดื่มสารละลายจากผงน้ำตาลเกลือแร่ในขณะที่ท้องร่วง เพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการอ่อนเพลีย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ
- หมดสติ เป็นลม การเคลื่อนไหวลดลง
- ฉี่ไม่ออก ปวดท้อง ท้องอืด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มึนงง ง่วงซึม ปวดหัว
- ปากแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** แคปซูลสีเขียว-เทาเข้ม
- **ตัวยาสําคัญ** โคลเพอราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่**
แลคโตสโมโนไฮเดรต, แป้งข้าวโพด, ทาลค์, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต

Lusomedicamenta Sociedade Técnica
Farmacêutica, S.A., Barcarena ประเทศโปรตุเกส

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200 โทรสาร: 02-792-7222

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 30 มีนาคม 2564
(CCDS version 17 Sep 2018)

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**