

เออร์ทาพีนัม**ความแรง 1 กรัม****ชนิดผงสำหรับละลายน้ำเพื่อใช้ฉีด****และหยดเข้าหลอดเลือดดำ****ชื่อการค้า ERNEM (เออร์เนม)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า เออร์ทาพีนัม โซเดียม (Ertapenem sodium) เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษา

- โรคติดเชื้อภายในช่องท้องชนิดซับซ้อน
- โรคติดเชื้อชนิดซับซ้อนของผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังรวมถึงการติดเชื้อของส่วนขาและเท้าในผู้ที่เป็โรคเบาหวาน
- โรคปอดบวมที่ติดมาจากชุมชน
- โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะชนิดซับซ้อน รวมถึง ไตและกรวยไตอักเสบ
- โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานชนิดเฉียบพลันรวมถึงเยื่อบุและกล้ามเนื้อมดลูกอักเสบหลังคลอด, โรคติดเชื้อจากการทำแท้งและหลังการผ่าตัดทางนรีเวช
- โรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด

ยานี้ใช้ป้องกัน

- โรคติดเชื้อที่บริเวณผ่าตัดในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดที่ลำไส้

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยแพ้ยาอื่นในกลุ่มยาคาร์บาเพเนม
- ⊗ เคยแพ้ยาอื่นในกลุ่มยาบีตาแลคแทมอย่างรุนแรง
- ⊗ กรณีให้ยาเข้ากล้ามเนื้อ ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยาเฉพาะที่ชนิดเอไมด์ และ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะช็อคอย่างรุนแรงหรือมีอาการหัวใจขาด (Hearth block)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีประวัติท้องร่วงรุนแรงจากการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
 - หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
 - กำลังใช้ ยาวาลโพรอิก แอซิด (Valproic acid) หรือ ยาไดวาลโพรเอกซ์ โซเดียม (Divalproex sodium)
 - มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง
 - มีประวัติความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น รอยโรคในสมอง หรือ มีประวัติชัก

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบติดต่อโรงพยาบาลและแจ้งแพทย์ทันทีที่นึกได้

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
 - o รับประทานต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
 - o ติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- ลมพิษบวมที่ใบหน้าเปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย
- ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีไข้

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ปวดหัว
- คลื่นไส้ อาเจียน
- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาผงไลโอไฟไลซ์สีขาวถึงเหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ เออร์ทาพีนัมโซเดียม
- ส่วนประกอบอื่นๆได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)

ผู้ผลิต เซฟวีเออร์ ไลฟ์เทค คอร์ปอเรชั่น ไถหนาน บรานซ์ อินเจคชั่น แพลนท์, ประเทศไต้หวัน

ผู้นำเข้า บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด, ประเทศไทย
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**