

ลิเวโทแรซีแทม
ความแรง 500 มก. ต่อ 100 มล.
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ข้อควรคำ Levetiracetam Syngens
(ลิเวโทแรซีแทม ซิมเจนส์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลิเวโทแรซีแทม (levetiracetam) มีตัวยา 500 มิลลิกรัม ใน 100 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มกันชัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มอนุพันธ์ของโพรโรลิโดน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท่านเป็นโรคไต
 - บุตรของท่านโตช้า หรือมีพัฒนาการทางเพศผิดปกติ
 - เคยได้รับยากันชักแล้วมีอาการซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
 - ท่านกำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรอื่นร่วมด้วย
 - ท่านกำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดยาให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม กระวนกระวายใจ ก้าวร้าว รับประทานอาหารลดลง กตการหายใจ และโคมา ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผื่นบนใบหน้าแล้วลูกกลามตามลำตัว ร่วมกับมีไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต
- ปัสสาวะไม่ออก บวมที่ขา-ข้อเท้า น้ำหนักขึ้นเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
- อารมณ์แปรปรวน สับสน ง่วงนอนมากผิดปกติ หลงลืม เดินลำบาก มือสั่น

“หากมีอาการเหล่านี้
 ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- โพรงจุกและคอหอยอักเสบ ปวดหัว
 - เบื่ออาหาร
 - ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิดกกังวล ตื่นกลัว หงุดหงิดง่าย
 - บ้านหมุน มึนงง
 - ปวดท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย อาเจียน
 - คลื่นไส้ ไอ
 - อาการแพ้
 - น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
 - ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อ มีความรู้สึกเป็นเหน็บ
 - ผมร่วง อาการคันบนผิวหนัง
- “ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่สามารถกลับบ้าน
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในถุงขนาด 100 มล. ปราศจากอนุภาค
- **ตัวยาสำคัญ** ลิเวโทแรซีแทม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Sodium Chloride (โซเดียมคลอไรด์) Sodium Acetate trihydrate (โซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต) Glacial Acetic Acid (กรดแกลเซียลแอซิดิก) Water for Injection (น้ำสำหรับฉีด)
- ผู้ผลิต บริษัทหนานกวง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศไต้หวัน
- ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรถู่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต