

เพมีเทรกเซต
ความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม
ชนิดผงยาเพื่อเตรียมเป็น
สารละลายเข้มข้นสำหรับ
ให้ทางหลอดเลือดดำแบบหยุด
ชื่อการค้า PEMETREXED EURODRUG
(เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก)

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะไร
ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซต (pemetrexed) เป็นยา
รักษาโรคมะเร็ง
- ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์
ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้นานี้
ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลัง
แพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- ห้ามใช้นานี้เมื่อไร
เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัด
เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาใน
กลุ่มกรดโฟลิก
เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อเด็ก
- ข้อควรระวังเมื่อใช้นานี้
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะ
ต่อไปนี้
- มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือ น้ำท่วมปอด
- กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
- กำลังกินหรือคิดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
- ผู้หญิงที่วางแผนมีลูกหรือกำลังตั้งครรภ์
- ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก

3. วิธีการใช้ยา

- ขนาดและวิธีใช้
ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิด
และความรุนแรงของโรค
บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยา
กับท่าน โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
- หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร
ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่
รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออกและ
หยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพอง หายใจลำบาก เจ็บ
หน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้นานี้
- ระหว่งใช้นานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก
- ระมัดระวังการขับขี้ปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการปลัดถจากที่สูง
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กรณียาเป็นต้องฉีด
วัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย

5. อันตรายจากยา

- อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมี
เสมหะเป็นเลือด
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น
- มีอาการเลือดออกจากระลอก ปาก จมูก ปัสสาวะสีแดง
หรือชมพู
- หายใจเร็วหรือเหนื่อยง่าย หน้ามืด
- รู้สึกอ่อนล้า หน้าซีด

"หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล
หรือเภสัชกรทันที"

- อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก ปวดท้อง
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
- ผอมลง การรับรสเปลี่ยนไป

"หากมีอาการรุนแรงหรือทอนไม่ ได้ ให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก เป็นผงยาสีขาวถึงเหลืองอ่อน
บรรจุในขวดแก้วใสไม่มีสี สำหรับเตรียมเป็นสารละลาย
และเจือจางเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
- เพมีเทรกเซต ยูโรดรัก ประกอบด้วยตัวยาสสำคัญ
เพมีเทรกเซต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล ไฮโดรคลอริค
แอซิด และโซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: Oncomed Manufacturing a.s.
Karásek 2229/1b, budova 02
Reckovice, 621 00 Brno, Czech Republic

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แมชชีฟิด เฮอร์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 กันยายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น