

แคพิไซทาบิน**ความแรง 500 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม****ชื่อการค้า Capecitabine Teva****(แคพิไซทาบิน เทวา)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- แคพิไซทา-บีน (capecitabine) เป็นยาหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งเต้านม และใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ้ำอีกหลังจากตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- เคยแพ้ยากลุ่มฟลูโอโรไพริมิดีนอย่างรุนแรง (กลุ่มยาที่รักษามะเร็ง เช่น ฟลูโอโรยูราซิล)
- กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
- มีปัญหาตับ หรือไตอย่างรุนแรง
- มีภาวะขาดเอนไซม์ ดีพีดี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากมีปัญหาตับ หรือไต
- แจ้งแพทย์หากมีหรือเคยมีปัญหาหัวใจ
- แจ้งแพทย์หากมีโรคทางสมอง ทางระบบประสาท หรือทางตา
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคเบาหวาน
- แจ้งแพทย์หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง
- แจ้งแพทย์หากกำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคเก๊าท์ ไตแก้ อัลโลพูรินอล ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วอร์ฟาริน ยาแก้อักเสบ เช่น เฟนิโทอิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามขนาดและวิธีใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารไม่เกิน 30 นาที เข้าและเย็น ตอนท้องว่าง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดก่อนทานยามื้อต่อไป โดยท่านอาจมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องร่วง แผลในปาก ปวดท้อง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- คุมกำเนิด เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับยยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจทำให้ง่วง และอ่อนเพลีย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องร่วงมากกว่า 4 ครั้ง หรือท้องร่วงตอนกลางคืน
- อาเจียนมากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
- เบื่ออาหารจนกินได้น้อยกว่าปกติ ตัวเหลือง ตาเหลือง
- เจ็บ บวม แดง มีแผลที่ปาก
- ไข้สูง หนาวสั่น รู้สึกเหนื่อย ปวดท้อง

- ปวด บวม แดง รู้สึกชา ที่มือหรือเท้า
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ
- เดินเซ
"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย
- คัน ผื่นที่ผิวหนัง
"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ออxygen โดยตรง โดยทั่วไปสามารถควรเก็บที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา ยาเม็ดรูปยาว ปลายมนทั้งสองข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มออกชมพู ด้านหนึ่งมีตัวเลข "500" อีกด้านหนึ่งเรียบ

ส่วนประกอบของยานี้ คือ ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, ไฮโปรเมลโลส, ซิลิกา คอลลอยด์คอลล แอนไฮดรัส, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไทเทเนียม ไดออกไซด์, แมโครกอล 400, เรด ไอรอน ออกไซด์, เยลโลว์ ไอรอน ออกไซด์

ผู้ผลิต Remedica Ltd., Limas, Cyprus

นำเข้าโดย: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร