

Benzonatate

ความแรง 100 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูลอ่อน

ชื่อการค้า ZCOUGH (ซีคัพ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเบนโซนาเทต (Benzonate) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยับยั้งอาการไอ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ บรรเทาอาการไอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
- อาจทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เสียชีวิต หากได้รับยาโดยไม่ตั้งใจ
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี และผู้ที่กลืนลำบากไม่ควรใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ในผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เข้า กลางวัน เย็น

- กลืนเม็ดยาทั้งเม็ด
- ห้ามแบ่ง บด หัก หรือเคี้ยวเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้ข้ามยามื้อนั้นไป และให้รอไปกินยา ในมื้อถัดไปเลย

- ห้ามกินยาเป็น 2 เท่าในครั้งเดียว

3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง [(เช่น สำลัก ลื่น ชัก หายใจติดขัด) ให้รีบนำส่ง โรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากเด็กได้รับยาโดยไม่ตั้งใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากได้รับยาทางช่องปากและเกิดอาการชาที่ลิ้น ปาก คอ หรือใบหน้าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารจนกว่าอาการจะหายไป และหากอาการยังคงอยู่ หรือแย่ลง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนิ่ง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หลอดลมหดเกร็ง กล้องเสียงหดเกร็ง หลอดเลือด หัวใจล้มเหลว

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน คัน ผื่น ท้องผูก ปวดท้อง แน่นหน้าอก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หยิบยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาเม็ดแคปซูลชนิดนิ่ม ทรงกลม สี สีส เหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ เบนโซนาเทต (Benzonate)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ gelatin 160 (เจลาติน 160), glycerin (กลีเซอริน), purified water (น้ำบริสุทธิ์)
- ผู้ผลิต บริษัท โลดัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, เมืองหนานโถว, ประเทศไต้หวัน
- ผู้นำเข้า บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ DDMMYY

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](#)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร