

เฟอริกคาร์บอกซีมอลโทส
ความแรง 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีดหรือหยด
ชื่อการค้า Ferinject (เฟอรินเจค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เฟอริกคาร์บอกซีมอลโทส (ferric carboxymaltose) มีตัวยา 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มธาตุเหล็ก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาภาวะขาดธาตุเหล็กในผู้ป่วยที่กินยาธาตุเหล็กไม่ได้หรือกินแล้วไม่ได้ผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือธาตุเหล็กชนิดฉีดอื่นๆ
- ห้ามใช้ในโรคเลือดจางที่ไม่ได้ขาดธาตุเหล็ก
- ห้ามใช้ในภาวะธาตุเหล็กเกิน หรือร่างกายใช้ธาตุเหล็กไม่ได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคภูมิแพ้ หรือเคยแพ้ยาใดๆ
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคเอสแอลอี
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคหอบหืดรุนแรง
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคผิวหนังอักเสบ
- แจ้งแพทย์หากกำลังเป็นโรคติดเชื้อ
- แจ้งแพทย์หากตับหรือไตทำงานบกพร่อง
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งท้องหรืออายุน้อยกว่า 14 ปี
- แจ้งแพทย์หากต้องจำกัดเกลือโซเดียม
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคไขหวัดใหญ่ โรคเกล็ดเลือดต่ำ โรคมะเร็งบางชนิด
- หากแพทย์แจ้งว่าค่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- “ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น” เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ให้ทางหลอดเลือดดำเท่านั้น ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

3.2 ถ้าฉีดยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

5. อันตรายที่เกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง รีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกัด
- ระคายเคืองบริเวณที่ฉีดหรือผิวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล “ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ อาจเกิดขึ้นได้

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เวียนหัว
 - ร้อน วูบวาบ
 - ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดแขน ปวดขา ตะคริว
 - ปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง
 - การรับรสเปลี่ยนไป มีอาการชา
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ยานี้เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** สารละลายเหลวทึบแสงสีน้ำตาลเข้ม ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้วใส ปิดด้วยจุกยาแล้วครอบทับด้วยฝาอะลูมิเนียม
- ตัวยาสําคัญ** ประกอบด้วย เฟอริกคาร์บอกซีมอลโทส 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ โซเดียม ไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, น้ำ

ชื่อผู้ผลิต

IDT BIOLOGIKA, ประเทศเยอรมัน

ชื่อผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 8-9 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 ตุลาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร