

**ริสดีแพลม**  
**ความแรง 0.75 มิลลิกรัมต่อ**  
**มิลลิลิตร**  
**ยาผงแห้งละลายน้ำสำหรับ**  
**รับประทาน**  
**ชื่อการค้า Evrydsi (อีวริสดี)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ริสดีแพลม (Risdiplam) มีตัวยา 0.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากไขสันหลังเสื่อม

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ถ้าหากมีการกินยาอื่น สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมด้วย
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หญิงตั้งครรภ์หรือมีแผนจะตั้งครรภ์
  - หญิงให้นมบุตรหรือมีแผนจะให้มนบุตร
  - ชายที่มีแผนจะมีบุตรหรือบริจาคอสุจิ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ยานี้ต้องผสมโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
- กินยาตามขนาดที่แนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งจะแจ้งท่านก่อนได้รับยา โดยรับประทานวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร
- เลือกใช้ไซริงก์ป้อนยาตามขนาดยาที่จะได้รับ
  - ไซริงก์ขนาด 6 mL ใช้สำหรับขนาดยา 1.0 mL – 6.0 mL
  - ไซริงก์ขนาด 12 mL ใช้สำหรับขนาดยา 6.2 mL – 6.6 mL
- หลังจากดูดยาเข้ามาในไซริงก์ให้กินยาทันที หากไม่ได้กินภายใน 5 นาทีให้ทิ้งยาในไซริงก์
- หากเกิดอาการอาเจียนหลังจากกินยา ไม่ควรกินยาเพิ่มและควรกินยาในวันถัดไปตามปกติ

### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกขึ้นได้ภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินทันทีที่นึกขึ้นได้
- หากลืมกินยานานกว่า 6 ชั่วโมง ให้ข้ามยาในครั้งนั้น และรอกินยาในครั้งถัดไปตามปกติ

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที และโปรดนำกล่องยาและเอกสารกำกับยาดูดตัวไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- คุมกำเนิดในระหว่างการใช้ยานี้จนถึงครบกำหนด 1 เดือนหลังจากหยุดใช้ยาสำหรับเพศหญิง และ 4 เดือนสำหรับเพศชายหากยาสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำ

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตาม ผิวหนัง หรือเลือดออกผิวดิบ
- มีไข้ ไอ และหายใจเร็วกว่าปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- บุคลากรทางการแพทย์จะผสมยาให้ท่านกลับบ้าน โดยเก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง ยาสามารถเก็บได้นาน 64 วันหลังจากผสม โปรดสังเกตวันหมดอายุของยาน้ำที่ผสมแล้วบนฉลาก “DISCARD AFTER วว/ดด/ปปปป”
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยานี้**  
ในกล่องยา 1 กล่อง ประกอบด้วย  
1. ขวดบรรจุยาผง สีเหลืองถึงสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอมเทา หรือสีเหลืองอมเขียว  
2. อะแดปเตอร์  
3. ไซริงก์ป้อนยาขนาด 6 mL จำนวน 2 อัน  
4. ไซริงก์ป้อนยาขนาด 12 mL จำนวน 2 อัน
- ตัวยาสําคัญ คือ** ริสดีแพลม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** Mannitol (แมนนิทอล), Isomalt (ไอโซมอลต์), Strawberry Flavor (สารแต่งรสชาติสตรอเบอร์รี่), Tartaric acid (กรดทาร์ทาริก), Sodium Benzoate (โซเดียมเบนโซเอต), Macrogol/Polyethylene Glycol 6000 (มาโครกอล/โพลีเอธิลีนไกลคอล 6000), Sucralose (ซูคราโลส), Ascorbic acid

(กรดแอสคอร์บิก), Disodium Edetate  
Dihydrate (ไดโซเดียมเอเดเตตไดไฮเดรต)

ผู้ผลิต: เอฟ ฮอฟฟ์แมน-ลา โรช แอล.ที.ดี.

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด, กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2563

ยานี้อยู่ภายใต้การสั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง และใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น