

โรพิวาเคนaiseโตรคลอไรด์

ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับฉีด/หยอดเข้าทาง
หลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Ropivacaine B. Braun
2 mg/ml (โรพิวาเคน บี. บราวน์
2 มก./มล.)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โรพิวาเคนaiseโตรคลอไรด์ (Ropivacaine Hydrochloride) 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาชาเฉพาะที่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อบรเทาอาการปวดเฉียบพลันในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทำให้ร่างกายชา เช่น หลังการผ่าตัด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เดຍแพ้ยาที่ห้ามใช้ส่วนประกอบของยา
- ⊗ เดຍแพ้ยาชาเฉพาะที่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ยาลิโดเคนหรือยาบูนพิวาเคน
- ⊗ ห้ามใช้เมื่อเส้นเลือด
- ⊗ ห้ามใช้เมื่อลูกเพื่อบรเทาปวดในระหว่างคลอดบุตร
- ⊗ มีปริมาตรเลือดน้อย (Hypovolaemia)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตับ หรือไต
 - คนในครอบครัวหรือคุณเป็นโรคพอร์ไฟเรีย
 - มีหรือเคยมีโรคประจำตัวอื่น ๆ
 - มีแผลตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ เช่น ยาลิโดเคน มอร์ฟีน อะมิโนดาโรม เเม็กซิเลทิน พลูโซชาเม็น อินอกซ่าซิน เป็นต้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ท่าน

3.2 ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร
หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรทำการมีนิ่ง
หน้ามืด ชาที่ริมฝีปากและลิ้น มีปัญหาการได้ยินและ
การมองเห็น ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับปัสสาวะขณะทำงานกับเครื่องจักรหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งต่อแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หัวใจเต้นช้าหรือเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ
- เวียนศีรษะ ปวดหัว เกร็ง เจ็บแปลบ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- วิตกกังวล
- ป่วยหลัง
- ไข้ หนาวสั่น
- ปัสสาวะลำบาก

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งต่อแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดใส่ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ:** โรพิวาเคนaiseโตรคลอไรด์ ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ :** โซเดียมคลอไรด์, กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต:

บริษัท บี. บราวน์ เมลซุงเกน เอจี เบอร์ลิน
ประเทศไทย

หรือ

บริษัท บี. บราวน์ เมดิคอล เอสເອ ຮູບີ ປະເທດສປປັນ

ผู้นำสั่ง:

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:

DD.MM.YYYY

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร