

## อะริพิพราโซล 10, 15 มิลลิกรัม ยาเม็ดแตกตัวในปาก Arepra 10 (อารีพรา 10) Arepra 15 (อารีพรา 15)

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะริพิพราโซล (Aripiprazole) มีตัวยาอะริพิพราโซล 10, 15 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาจิตเวช

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการทางจิตเวช

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะต่อไปนี้
  - น้ำตาลในเลือดสูง
  - อาการชัก
  - การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า
  - ความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและหัวใจ
  - การเกิดลิ่มเลือด
  - มีประวัติติดการพนันอย่างมาก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาต้านเชื้อรา และ ยาต้านไวรัส HIV
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีกินทำได้ 2 วิธี เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
  - ใช้มือที่แห้งหยิบยาออกจากแผงทันทีที่เปิดแผงยา วางเม็ดยบบนลิ้น ยาจะกระจายตัวอย่างรวดเร็วในน้ำลาย โดยห้ามกลืนยาทั้งเม็ดสามารถกินยาร่วมกันน้ำหรือไม่ได้
  - กระจายเม็ดยาในน้ำธรรมดาและดื่มยาให้หมด
- ควรกินยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหาร

#### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ห้ามกินยาสองครั้งในหนึ่งวัน และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น หัวใจเต้นเร็ว การเคลื่อนไหวผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้เกิดอาการง่วง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการของโรคเบาหวาน เช่น หิวน้ำหรืออาหารกว่าปกติ ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้
- มีอาการของการติดเชื้อ เช่น เจ็บคอ หรือมีไข้
- มีความคิดจะฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย
- ปวด บวม แดงบริเวณขาซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะมีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องบวม
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาเจียน เหงื่อออก
- การแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- นอนหลับยาก วิดกกังวล กระสับกระส่าย สั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วง ตาพร่า

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

อะริพิพราโซล 10 มิลลิกรัม: ยาเม็ดกลมแบนขอบเอียงสีขาว ด้านหนึ่งมีตัวเลข "1" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "ZT"

อะริพิพราโซล 15 มิลลิกรัม: ยาเม็ดกลมแบนขอบเอียงสีเหลืองต่าง ด้านหนึ่งมีตัวเลข "2" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "ZT"

ส่วนประกอบในตำรับ: Silicified microcrystalline Cellulose, Aspartame, Vanilla flavour, Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, Yellow iron oxide

(กรณีอะริพิพราโซล 15 มิลลิกรัม)

**ผู้ผลิต:** Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000, MALTA

**ผู้นำเข้า:** บริษัท สීමการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:** 24 เมษายน 2562