

อีโพอีทิน เธต้า

2,000 ไออยู, 3,000 ไออยู, 5,000 ไออยู,
10,000 ไออยู, 20,000 ไออยู, 30,000 ไออยู
ชนิดสารละลายน้ำบรรจุหลอดยาพร้อมฉีด
ชื่อการค้า EPORATIO (อีโพเรโซ)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่ออีโพอีทิน เธต้า (epoetin theta) เป็นยากลุ่มกระตุนการสร้างเม็ดเลือดแดง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาภาวะเลือดจางจากโรคไตวายเรื้อรัง
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่ห้ามใช้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- แจ้งแพทย์ ถ้าเป็นโรคความดันเลือดสูง
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีภาวะตับวายเรื้อรัง
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีการทำงานของต่อมกรวย
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีภาวะหลอดเลือดดีบดัน
- แจ้งแพทย์ ถ้าเคยใช้ยากระตุนการสร้างเม็ดเลือด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกลส์ชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ท่านโดยฉีดเข้า ใต้หนัง หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบไปฉีดยาทันทีที่นึกได้
- ถ้านึกขึ้นได้ในวันที่จะฉีดยาครั้งถัดไป ให้ข้ามครั้งที่ลืม และไม่ต้องฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าฉีด yan เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้าท่านสงสัยว่าฉีดยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระหว่างการใช้ยานี้ต้องตรวจดูความดันเลือดอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องแจ้งแพทย์ทราบก่อนผ่าตัด ว่าใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามีด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดหัว สำสัน การพูดผิดปกติ เดินเซ ซัก “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูง ปวดหัว ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการล้ายไข้หวัดใหญ่
- ปวด บวม บริเวณที่ฉีดยา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยหัวไป ควรเก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา ของเหลวใสและไม่มีสี บรรจุในหลอดยา พวยมีฉีด

ตัวยาสำคัญ อีโพอีทิน เธต้า

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียม ไดไฮดรเจน ฟอฟเฟต ไดไฮเดรต, โซเดียม คลอไรด์, โพลีซอร์เบต 20, โทรเมทานอล, ไฮโดรคลอริก แอดซิต และน้ำ ประกอบด้วย

อีโพอีทิน เธต้า 2,000 ไออยู/0.5 มิลลิลิตร

อีโพอีทิน เธต้า 3,000 ไออยู/0.5 มิลลิลิตร

อีโพอีทิน เธต้า 5,000 ไออยู/0.5 มิลลิลิตร

อีโพอีทิน เธต้า 10,000 ไออยู/1 มิลลิลิตร

อีโพอีทิน เธต้า 20,000 ไออยู/1 มิลลิลิตร

อีโพอีทิน เธต้า 30,000 ไออยู/1 มิลลิลิตร

ผู้ผลิต Merckle GmbH, Blaubeuren, Germany

ผู้นำเข้า บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร