

บอร์ทีโซมิบ
ความแรง 3.5 มิลลิกรัม
ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Bortezomib Teva
(บอร์ทีโซมิบ เทวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอร์ทีโซมิบ (Bortezomib) เป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโลมา
- รักษา มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**
 - เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
 - ดับทำงานผิดปกติระดับปานกลางหรือรุนแรง
 - มีอาการชา ปวดแปลบที่มือหรือเท้า
 - เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
 - เลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ
 - ไตทำงานผิดปกติ
 - เคยชัก
 - กำลังเป็นงูสวัด
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตามัว ตามพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน
 - ความจำเสื่อม การคิดมีปัญหาคือ เดินลำบาก สูญเสียการมองเห็น **เพราะเป็นอาการของการติดเชื้อมะเร็งที่สมอง**
 - เคยได้รับยานี้แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
 - เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ยานี้ **เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย**
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด **เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้** เช่น
 - ยาตีโทโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อรา
 - ยาริโทนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์
 - ยาไรแฟมพิซิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค
 - ยารักษาโรคลมชัก
 - ยารักษาเบาหวาน
- “หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมมาฉีดยาหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม ตามพร่า มือเท้าเย็น เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว เหนื่อยหรือสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้แจ้ง แพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานอนันต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยานี้ และต้องคุมกำเนิดไปนานอีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยานี้หรือตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจสั้น
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
- ชัก ปวดหัว สับสน ตามพร่า ตามัว เห็นภาพเบลอ ง่วงซึม เดินลำบาก

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาล

- มีอาการชา ปวดแปลบที่มือหรือเท้า
 - มือ เท้า หัวเข่าหรือขาตื้อตึงบวม
 - หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
 - ชีต อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 - ติดเชื้อง่าย มีอาการคล้ายเป็นหวัด
 - คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
 - ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องร่วง
 - แผลในปาก
 - ผม่วหรือผมมีลักษณะผิดปกติ
- “ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้ง แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่า
แกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา ผงยาสีขาวถึงสีขาวนวล

ตัวยาสำคัญ บอริทีโซมิบ

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล (mannitol)

ผู้ผลิต Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Israel

ผู้นำเข้า บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ:

พฤศจิกายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**เตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**