

โลเพอราไมด์  
ความแรง 2 มิลลิกรัม  
ชนิดแคปซูล  
ชื่อการค้า Imodium® (ลีโอเดียม)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โลเพอราไมด์ (Loperamide)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการท้องเสียชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่ท้องเสียรุนแรงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่ท้องเสียที่มีเลือดปนกับอุจจาระและมีไข้สูง
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการท้องผูก หรือมีภาวะท้องอืดมาก
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นผู้ป่วยโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ
  - ท้องเสียมานานกว่า 48 ชั่วโมง หรือท้องเสียอย่างรุนแรง
  - เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือหัวใจทำงานผิดปกติ
  - เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งท้อง
  - เป็นหญิงให้นมลูก
  - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ : กินครั้งแรก 2 แคปซูล หลังจากนั้นกิน 1 แคปซูล เมื่อมีอาการถ่ายเหลว
- ห้ามเกินวันละ 8 แคปซูล

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ห้ามกินยาเพื่อชดเชย

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดปกติ อาการลงแดงจากการขาดยา ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- หากจากใช้ยานี้ไปแล้ว 48 ชั่วโมง อาการไม่ดีขึ้น ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะท่านอาจอ่อนแรงจากอาการท้องเสียและยาอาจทำให้มีอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัวได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ
- ปวดท้องรุนแรง ท้องอืดมาก ท้องผูกรุนแรง
- รุ่มาตาหัด มองเห็นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- รู้สึกไม่สบาย ปวดหัว
- ท้องอืด ไม่สบายท้อง
- ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา แคปซูลสีเขียว-เทาเข้ม
- **ตัวยาสาคัญ** โลเพอราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, แป้งข้าวโพด, ทาลค์, แมกนีเซียมสเตียเรต

## ผู้ผลิต

Lusomedicamenta Sociedade Técnica  
Farmacêutica, S.A., Barcarena ประเทศโปรตุเกส

## ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  
กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 1800-333-666 (โทรฟรียกเว้นโทรศัพท์มือถือ)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2565  
(CCDS version 13, 23-AUG-2021)

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข:**

- 1. ห้ามใช้ในเด็กและคนชรา**
- 2. หลังจากใช้รักษาโรคท้องร่วงชนิดเฉียบพลัน  
เกิน 48 ชั่วโมงไปแล้ว และอาการไม่ดีขึ้นให้  
หยุดยาและปรึกษาแพทย์**