

ฟอสโฟไมซิน
ความแรง 3 กรัม
ชนิดผงละลายน้ำสำหรับกิน
ชื่อการค้า FOSFOMICINA (ฟอสโฟไมซินนา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าฟอสโฟไมซินโทรเมตามอล (fosfomicin trometamol) เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ หรือ ป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการสอดเครื่องมือหรือผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
- เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี **เพราะ**ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก
- มีประวัติท้องร่วงรุนแรงจากการใช้ยาด้านแบคทีเรีย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด **เพราะ**อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาเมโทโคลพราไมด์ วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาตอนท้องว่าง โดยกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ กินหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
- ผสมผงยา โดยเทลงในน้ำ 50 ถึง 75 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน แล้วกินยาทันที

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และ**ห้าม**กินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้**ดื่มน้ำมากๆ** เพื่อกำจัดยาส่วนเกิน
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เดินเซ หุนหวน มีรสคล้ายมีโลหะในปาก การรับรสผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหวังกการใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันครบทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้น**เชื้อ**จะดีดยา
- ระมัดระวังการขับขี้ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง **เพราะ**ยานี้ทำให้**วังง**ซึมได้

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.



<https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>



<http://ndi.fda.moph.go.th/>

5. อันตรายที่เกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็ว
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ปวดท้อง ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีไข้

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย แสบยอดอก
- คันในช่องคลอด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยาผงสำหรับละลายน้ำ มีลักษณะเป็นเม็ดแกรนูลสีขาวถึงขาวนวล
 - ส่วนประกอบอื่นๆ: ซูโครส, แซ็กคารินโซเดียม, แต่งกลิ่นส้มเกลี้ยง, แต่งกลิ่นส้มเปลือกอ่อน
- ผู้ผลิต: LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U., Spain
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด, กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566