

เลโวเซทิรีซีน
5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
LEVOZINE (เลโวซีน)

คำเตือน

- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีที่ให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- ระวังการใช้นานร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines หรือยาด้านอาการซึมเศร้าชนิดต่างๆ
- ระวังการใช้นานในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคไต
- ยานี้อาจทำให้ตาพร่า สับสน และปัสสาวะขัดได้

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เลโวซีน (Levozine) มีตัวยา เลโวเซทิรีซีน (Levocetirizine) เป็นตัวยาสำคัญ เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะต่อไปนี้ เช่น
- เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (รวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด persistent rhinitis) ได้แก่ อาการ คัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล คันตา ตาแดง น้ำตาไหล
- ผื่นลมพิษ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้นานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือยาเซทิรีซีน หรือยาไฮดรอกซีซีน หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง และต้องล้างไต

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ผู้ป่วยโรคลมชัก
- มีภาวะปัสสาวะคั่งจากภาวะต่างๆ เช่น ต่อมลูกหมากโต หรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังให้นมทารก
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ: กิน 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันที หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้นานี้

- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการง่วงซึม ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปากแห้ง คอแห้ง
- เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง ง่วงซึม

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่ายาให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว พันมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา :** เม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั้งสองด้าน
- ตัวยาสัญชาติ :** เลโวเซทิรีซีน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** แคลโดสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, พิเอช 102, คอลลอยด์อลซิลิกอนไดออกไซด์แอนไฮไดรด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, โอปาตราไวท์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และน้ำ

ผู้ผลิต: บริษัท ยูเมต้า จำกัด

26/18-21 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา
หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: พฤศจิกายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร