

เอกสารกำกับยาภาษาไทย (ใหม่ / ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

**เด็กซ์แทرن 1 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และไயโพรเมลโลส
3 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร
ยาหยดตาชนิดไม่มีสารกันเสีย
ชื่อการค้า Pharma Innova
Lubricant Eyes drops
(ฟาร์มา อินโนวา ลูบริกแคนธ
อายส์ ดรอปส์)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ฟาร์มา อินโนวา ลูบริกแคนธ อายส์ ดรอปส์ (Pharma Innova Lubricant Eyes drops) มีตัวยาเด็กซ์แทرن 1 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร และไயโพรเมลโลส 3 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาหยดตาชนิด ไม่มีสารกันเสีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- บรรเทาอาการแสบตาและระคายเคืองตาที่เกิด ขึ้นบวกรุ เนื่องจากตาแห้ง นำตาหรือสาร หล่อลื่นในตาหลังน้อย ใช้สำหรับบรรเทา อาการระคายเคืองตาที่ไม่รุนแรงจากการถูกลม หรือแสงแดด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เด็กแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ล้างมือให้สะอาด
- ดึงหลอดยาออกจากแผงและเปิดหลอดยาโดย การบิดฝ่าหลอดออก

- ดึงหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและ เงยหน้าขึ้น
- ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่าง ลงมาให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตาขึ้น ด้านบน
- หยดยา 1-2 หยดลงในกระพุ้งของ เปลือกตาล่าง ระวังอย่าให้ไปลาย- หลอดสัมผัสตา ขนตา เปลือกตา มือ หรือสิ่งอื่นใด
- ปิด oczy มือจากเปลือกตาล่าง และอย่า กะพริบตาสักครู่
- หากต้องการหยดตาอีกข้างหนึ่ง ทำข้ามในขั้น- ตอนข้างตัน และทิ้งหลอดหยดไป หลังจากนี้ แล้ว ไม่ควรเก็บไว้ในข้ามอีก

- 3.2 หากลืมหยดยาควร怎么办**
หากยังมีอาการ ให้หยดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือ ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

- 3.3 ถ้าหยดตาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำ อย่างไร**
โดยปกติการได้รับยาที่เกินขนาดไม่ก่อให้เกิด อันตราย



- ผึ้นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลดลอก มีจ้ำดาม ผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ “ให้น้ำยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนไป
- ระคายเคืองตา ตาแดง “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดย ทิ้งไว้ในภาชนะที่อนุญาตไม่เกิน 30 องศาเซล- เชซิล ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา :** น้ำยาปราศจากเชื้อ สีขาว半透明 ไม่มีสี ถึงสีอ่อนเหลือง
- **ตัวยาสำคัญ :** เด็กซ์แทرن และไயโพรเมลโลส
- **ส่วนประกอบอื่นๆ :** ได้แก่ โซเดียมบอร์เตต, โพแทสเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์และน้ำผึ้งผลิต บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด

1/38 หมู่ 4 ถนนสีลมคลองเจ็ด
ต.ปีงค่าพรอย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-9715335 แฟกซ์ 02-9715470

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: ธันวาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อป.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามใช้ยาที่ หากน้ำยาไม่ลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นสี น้ำนม สี ชุ่น หรือมีตะกอน
- ห้ามใช้ยาที่ หากภาชนะบรรจุ หรือบรรจุภัณฑ์ ภายในอยู่ในปีดผนึก หรือชำรุด
- ไม่สัมผัสปลายหลอดที่เปิดแล้ว และไม่ให้ไปลาย หลอดสัมผัสลูกน้ำยนต์ หรือพ่นผิวนองดวงตา
- ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก