

เอนซาลูทาไมด์
ความแรง 40 มิลลิกรัม
ชนิด แคปซูลนิ่ม
ชื่อการค้า Allutamide (อัลลูทาไมด์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอนซาลูทาไมด์ (enzalutamide) มีตัวยา 40 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยชายที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เมื่อตั้งท้อง หรือคิดว่าจะตั้งท้อง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เคยชัก เส้นเลือดในสมองแตก ประสบอุบัติเหตุทางสมองหรือมีเนื้องอกในสมอง
 - มีประวัติเป็นโรคหัวใจ
 - มีความดันเลือดสูง
 - มีไขมันในเลือดสูง
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในเด็ก
- ยานี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ หากต้องการมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์
- ยานี้อาจส่งผลต่อยาอื่นได้ ดังนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ ทราบว่ากำลังใช้ยา วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นก่อนใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด หัก หรือเคี้ยวเม็ดยา

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมหากินยาในเวลาประจำ ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้
- หากลืมหากินยาในวันนั้น ให้กินยาตามปกติในวันถัดไป
- หากลืมหากินยามากกว่า 1 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- ห้ามกินยาเป็น 2 เท่าเมื่อลืมหากินยา

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ และให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด อาจมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชักได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรเริ่มหรือหยุดใช้ยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นระหว่างใช้ยานี้โดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ก่อน
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง หรือปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ใช้ถุงยางอนามัยและคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา และหลังจากการรักษา 3 เดือน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ชัก

- อาการปวดหัวที่แยแส สับสน การมองเห็นลดลง เบลอ หรือปัญหาการมองเห็นอื่น ๆ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อ่อนล้า เหนื่อยกว่าปกติ
- เบื่ออาหาร
- ปวดหลัง
- ท้องเสีย ท้องผูก
- ปวดข้อ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแพ่งก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดแคปซูลชนิดนิ่ม ทรงรี สีขาวถึงขาวครีม บรรจุของเหลวใสไม่มีสี ถึงสีเหลืองอ่อน
- **ตัวยาสำคัญ** เอนซาลูทาไมด์ (enzalutamide)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Caprylocaproyl macrogolglycerides (คาพริโลคาโพรอิลแมคโครกอลกลีเซอไรต์), Butylhydroxyanisole (บิวทิลไฮดรอกซีอนิโซล) และ Butylhydroxytoluene (บิวทิลไฮดรอกซีโทลูอีน) Gelatin 160 (เจลาติน) Glycerol (กลีเซอรอล) Sorbitol (ซอร์บิทอล) Titanium dioxide E171 (ไททาเนียมไดออกไซด์) และ Purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ผู้ผลิต บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, ไต้หวัน
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

**คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**