

พาลิเพอริโดน
25, 50, 75, 100, 150 มิลลิกรัม
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน
สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ชื่อการค้า INVEGA SUSTENNA®
(อินเวกา ซัสเทนนา®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้ชื่อว่า พาลิเพอริโดน พาลมิเตท (paliperidone palmitate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

• รักษาโรคจิตเภทที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ อยู่ในระยะให้นมลูก
- ⊗ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ⊗ มีประวัติแพ้ยาโรคจิตเภทชนิดอื่นๆ รวมถึงยาที่มีริสเพอริโดนเป็นส่วนประกอบ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้องหรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
- เป็นโรคพาร์กินสัน
- เป็นโรคหัวใจ หรือ มีภาวะความดันโลหิตต่ำ
- เป็นโรคลมชัก
- ความดันเลือดตก หน้ามืด เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
- มีหรือเคยมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในเลือด
- มีการทำงานของ ไต หรือ ตับ ผิดปกติ
- เคยมีไข้สูงร่วมกับตัวแข็งเกร็ง

- มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณลิ้นหรือใบหน้า
- มีความเสี่ยงที่จะเป็น หรือเป็นโรคเบาหวาน
- เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย
- อวัยวะเพศแข็งตัวนานหรือเจ็บในผู้ชาย
- กำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ
- หากมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกในต่อมไธสมอง (ต่อมพิทูอิทารี)
- มีปัญหาด้านการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย หรืออุณหภูมิร่างกายร้อนเกิน
- มีปริมาณฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสูงผิดปกติ หรืออาจมีภาวะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนโปรแลคติน
- ถ้าคุณหรือคนในครอบครัวมีประวัติเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากยาโรคจิตเวชมีความเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าว
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน หรือ แก้มักัน
 - เริ่มต้น ฉีด 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์
 - หลังจากนั้น ฉีดเดือนละ 1 ครั้ง

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ หรือ โรงพยาบาลที่รักษาทันทีที่นึกได้ เพื่อทำการนัดวันมาฉีดยาให้เร็วที่สุด

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์และพยาบาลทันที เช่น
 - ง่วงซึม
 - หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 - ตัวแข็งเกร็งเคลื่อนไหวลำบาก
 - เชื่องช้า หรือ การเคลื่อนไหวผิดปกติที่บริเวณใบหน้า ลำตัว แขนหรือขา“หากมีอาการเหล่านี้ ให้รีบแจ้งแพทย์และพยาบาลทันที”
- คุณจะได้รับยาตัวนี้ภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะได้รับยามากเกินไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงจากยา
- ห้ามหยุดการรักษาเอง เพื่อผลการรักษาที่ดี
- แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
- แจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยาตัวนี้อยู่ หากวางแผนที่จะผ่าตัดตา
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- คุณกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งท้องระหว่างการใช้ยานี้
- ระวังระวังในการลุกขึ้นจากการนั่งหรือนอน เนื่องจากอาจเกิดอาการวูบได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำเหลืองลอก มีจ้ำตามผิวน้ำเหลืองหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการบวม เจ็บ หรือแดงที่ขา
- มีภาวะสมองเสื่อมและสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง จับพยาน หรือมีภาวะอ่อนแรงทันทีทันใด ขาบริเวณใบหน้า ขาที่แขนหรือขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาข้างเดียว หรือมีอาการพูดคำคละละเลื้อน แม้จะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
- มีไข้ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เหงื่อออก หรือความรู้สึกตัวลดลง
- เพศชาย: มีภาวะองคชาติแข็งตัวนาน หรือเจ็บปวดเมื่อองคชาติแข็งตัว

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- มีอาการคัน ปวด หรือ บวม ผิวน้ำเหลืองเป็นผื่นบริเวณที่มีการฉีดยา
- นอนหลับหรือคงการนอนหลับยาก
- ปวดศีรษะ, ปวดหลัง
- เป็นไข้หวัด, ไอ, คัดจมูก
- ปวดหรือไม่สบายท้อง, อาเจียน, คลื่นไส้, ท้องผูก, ท้องเสีย, การย่อยอาหารไม่ดี, ปวดฟัน
- เพศชาย : เต้านมโต การทำให้องคชาติแข็งตัวหรือคงการแข็งตัวยากขึ้น หรือ มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
- เพศหญิง : มีอาการคัดเต้านม มีอาการน้ำนมไหล ประจำเดือนขาด หรือ ปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับรอบประจำเดือน

- น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง
- มีความหงุดหงิด, ภาวะซึมเศร้า, มีความวิตกกังวล
- เดินลากเท้าแบบช้าๆ มีอาการสั่นขณะพัก น้ำลายเพิ่มขึ้น และ/หรือ น้ำลายไหล และสูญเสียการแสดงออกทางใบหน้า
- ภาวะกล้ามเนื้อตึงผิดปกติ, ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของดวงตา ปาก ลิ้น หรือ ขากรรไกร
- มีความกระสับกระส่าย, มีความดันตัวลดลง, มีอาการสั่น
- หัวใจเต้นเร็ว
- ความดันโลหิตสูง
- ความอยากอาหารลดลง
- มีอาการง่วงนอน
- ปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่อ
- มีความรู้สึกเหมือนเป็นหวัด มีไข้ มีภาวะอ่อนแรงเหนื่อยล้า

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- น้ำยาแขวนตะกอน สีขาวถึงขาวนวล บรรจุในไซริงค์พร้อมฉีดยา สำหรับใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
- ตัวยาสำคัญ คือ พาลีเพอริโดน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ กรดซิตริกโมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate), ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮไดรอส (disodium hydrogen phosphate anhydrous), พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000 (polyethylene glycol 4000), พอลิซอร์เบท 20 (polysorbate 20),

โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โมโนไฮเดรต (sodium dihydrogen phosphate monohydrate), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide), น้ำสำหรับยาฉีด (water for injection)

ผู้ผลิต

1.Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, ประเทศเบลเยียม

2.Cilag AG, Schaffhausen, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-792-7200 โทรสาร: 02-792-7222

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:

5 พฤษภาคม 2564

(Base CCDS V 07 May 2018)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ข้อมูลยาสำหรับผู้ช่วยฉบับภาษาไทย

อินวีก้า ซัสเทนนา®

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท (INN: paliperidone palmitate)

น้ำยาแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ



ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ใช้เพื่ออะไร?

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาต้านโรคจิต และ ใช้ในการรักษาโรคจิตเภท หรือ โรคจิตเภทที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (schizoaffective disorder) ในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป) นอกจากนี้หลังจากที่อาการดีขึ้นยังมีการใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา เพื่อลดโอกาสในการกลับเป็นซ้ำ ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ไม่ใช้ในการรักษาผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีที่เป็นโรคจิตเภท หรือ โรคจิตเภทที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (schizoaffective disorder)

ผู้ป่วยโรคจิตเภท หรือ โรคจิตเภทที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (schizoaffective disorder) ไม่ได้มีอาการที่เหมือนกันทุกราย อาการบางอย่างที่มีการพบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท และ โรคจิตเภทที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (schizoaffective disorder) อาจประกอบด้วย:

- มองเห็น รู้สึก ได้ยิน หรือได้กลิ่นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง (อาการประสาทหลอน)
- มีความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง (ภาวะหลงผิด)
- มีความรู้สึกหวาดระแวงหรือไม่ไว้วางใจคนอื่น และมีความรู้สึกกระแวงสงสัยมาก(ภาวะหวาดระแวง)
- หลีกเลี้ยงครอบครัวและเพื่อน และต้องการที่จะอยู่ตามลำพังคนเดียว

โรคจิตเภทที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (Schizoaffective disorder) อาจประกอบด้วย:

- มีความกระฉับกระเฉงหรือตื่นเต้นมากเกินไป (ภาวะฟุ้งฟ่าน (mania))

- มีอาการซึมเศร้า ซึ่งอาจประกอบด้วย รู้สึกเศร้า รู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกไร้ที่พึ่ง รู้สึกเหนื่อย หรือ นอนหลับมากหรือนอนหลับไม่เพียงพอ



ห้ามใช้ยาอินวีگا ซัสเทนนา เมื่อไร?

ห้ามใช้ยาอินวีกา ซัสเทนนา ถ้าพบว่าเคยมีประวัติการเกิดปฏิกิริยาการแพ้ (ภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity)) พาลีเพอริโดน หรือ สารประกอบอื่นๆในยาอินวีกา ซัสเทนนา หรือ ริสเพอริโดน ที่เป็นยาที่เป็นยาต้านโรคจิตอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกับ พาลีเพอริโดน ภาวะภูมิไวเกิน(hypersensitivity)สามารถสังเกตได้จาก มีผื่นตามผิวหนัง มีอาการคัน อาการหายใจลำบาก หรือ มีอาการบวมที่ใบหน้า ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที ถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

ข้อควรดูแลเป็นพิเศษระหว่างการใช้อย่างไร?

ผู้ป่วยสูงอายุ

ยังไม่เคยมีการศึกษาการใช้อย่างไรในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อย่างไรก็ตามผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยยาอื่นที่คล้ายกัน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ เสียชีวิตได้

ผู้ป่วยทั้งหมด

ถ้าคุณมีภาวะใดๆดังต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์เนื่องจากแพทย์อาจต้องมีการปรับขนาดยาหรือเฝ้าติดตามคุณเป็นเวลาระยะหนึ่ง

- ถ้าคุณเป็นโรคพาร์กินสัน หรือ โรคสมองเสื่อม
- ถ้าคุณเคยได้รับการวินิจฉัยด้วยอาการดังนี้ มีอุณหภูมิสูง และ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (กลุ่มอาการ Neuroleptic Malignant Syndrome)
- ถ้าคุณเคยประสบกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณลิ้นหรือใบหน้า (Tardive Dyskinesia)
- ถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหรือระดับน้ำตาลในเลือดสูง

- ถ้าคุณเป็นโรคหัวใจหรือมีการรักษาโรคหัวใจที่ทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะมีภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือมีแนวโน้มที่ความดันโลหิตจะลดต่ำลง หรือ รู้สึกเวียนศีรษะเมื่อคุณมีการยืนขึ้นเปลี่ยนจากทำนอนหรือทำนั่ง
- ถ้าคุณเป็นโรคลมชัก
- ถ้าคุณมีหรือเคยมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในเลือด รับประทานยาโดยทันทีที่คุณเกิดมีไข้หรือติดเชื้อ ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาอินวีก้า ซัสเทนนา
- ถ้าคุณสูญเสียการทำงานของไต แพทย์อาจลดขนาดยาอินวีก้า ซัสเทนนาถ้าไตของคุณมีการทำงานลดลง
- ถ้าคุณสูญเสียการทำงานของตับ
- ถ้าคุณมีภาวะของคชาติแข็งตัวนาน และ/หรือ เจ็บปวดเมื่อองคชาติแข็งตัว
- ถ้าคุณมีปัญหาด้านการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
- ถ้าคุณหรือคนในครอบครัวของคุณมีประวัติเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด และขาเคยถูกพบในผู้ป่วยที่ได้รับยาอินวีก้า ซัสเทนนา การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ถึงแม้ว่าคุณจะเคยทนต่อยาพาลีเพอริโดนหรือริสเพอริโดนรูปแบบรับประทาน ปฏิกริยาการแพ้หลังจากฉีดยาอินวีก้า ซัสเทนนามีการเกิดขึ้นแต่พบได้น้อยมาก (very rarely) ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการผิวหนังเป็นผื่น บวมบริเวณลำคอ มีอาการคัน หรือ มีปัญหาด้านการหายใจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาการแสดง (sign) ของปฏิกริยาการแพ้ขั้นรุนแรง

มีการพบภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านโรคจิต แพทย์อาจมีการเฝ้าติดตามน้ำหนักตัวของคุณระหว่างคุณรับการรักษาด้วยยาอินวีก้า ซัสเทนนา

ระหว่างรับการผ่าตัดดวงตาสำหรับความขุ่นของเลนส์ตา (ต้อกระจก) รุมาตา (วงกลมสีดำตรงกลางดวงตาของคุณ) อาจไม่ขยายขนาดตามต้องการ นอกจากนี้ ม่านตา (ส่วนของดวงตาที่มีสี) อาจย้ายไปทะลุออกมาระหว่างรับการผ่าตัดและอาจจะส่งผลเกิดความเสียหายต่อดวงตาได้ หากคุณกำลังวางแผนในการรับการผ่าตัดดวงตาของคุณ ให้มั่นใจว่าคุณได้มีการแจ้งแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาตัวนี้อยู่



การใช้ในสตรีมีครรภ์

แจ้งแพทย์ว่าคุณกำลังหรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรใช้ยาอินวีگا ซัสเทนนา ระหว่างตั้งครรภ์เว้นแต่ได้มีการปรึกษากับแพทย์แล้ว อาจเกิดอาการเหล่านี้ ได้แก่ อาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และ/หรืออ่อนแรง มีอาการง่วงนอน ภาวะหัวใจไม่สงบ มีปัญหาด้านการหายใจ หรือ มีความลำบากในการกินอาหาร กับทารกแรกเกิดถ้าคุณมีการใช้ยาอินวีگا ซัสเทนนา ระหว่างการตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้าย



การใช้ในสตรีให้นมบุตร

ห้ามให้นมบุตรระหว่างที่คุณกำลังได้รับการรักษาด้วยยาอินวีگا ซัสเทนนา ปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ต้องการให้นมบุตร



ผลต่อความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร

ยาอินวีگا ซัสเทนนาอาจมีผลต่อความตื่นตัวและการมองเห็น ดังนั้นจึงแนะนำว่าไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะทราบถึงการตอบสนองของคุณต่อยาอินวีگا ซัสเทนนา



ยาอื่นๆ และแอลกอฮอล์

โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าคุณกำลังหรือเพิ่งใช้ยาตัวอื่น ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อเองโดยปราศจากใบสั่งยาจากแพทย์ โปรดทราบว่ายาบางตัวสามารถเพิ่มระดับยาพาลีเพอริโดนในกระแสเลือดของคุณได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงมากขึ้นใกล้เคียงกับการได้รับยาอินวีก้า ซัสเทนนา เกินขนาด (ดูหัวข้อ การได้รับยาเกินขนาด ด้านล่าง)

เนื่องจากยาอินวีก้า ซัสเทนนา สามารถทำให้คุณรู้สึกง่วงหรือซึม จึงควรระมัดระวังในเมื่อได้รับยาอินวีก้า ซัสเทนนา ร่วมกับยาตัวอื่นที่สามารถส่งผลทำให้ง่วงหรือซึม

เนื่องจากยาอินวีก้า ซัสเทนนา สามารถลดความดันโลหิตได้ จึงควรระมัดระวังเมื่อได้รับยาอินวีก้า ซัสเทนนา ร่วมกับยาตัวอื่นที่ลดความดันโลหิต

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา สามารถลดประสิทธิผลของยาด้านพาร์กินสัน และ กลุ่มอาการขาไม่อยู่นิ่ง (restless legs syndrome) (เช่น ยาเลโวโดปา)

ควรใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ด้วยความระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาที่เพิ่มการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง (ยากลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นจิตใจ (psychostimulants) เช่น เมทิลเฟนิเดต)

ควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา



ขนาดและวิธีใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา

ถ้าคุณไม่เคยใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา พาลีเพอริโดน หรือ ริสเพอริโดนมาก่อน แพทย์จะมีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณสามารถทนต่อยาได้ โดยการให้คุณใช้ยาในรูปแบบรับประทานวันละครั้งเป็นเวลาไม่กี่วัน ก่อนหน้าที่จะเริ่มยาอินวีก้า ซัสเทนนา

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา จะถูกบริหารยาโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ห้องทำงานแพทย์หรือคลินิก แพทย์จะแจ้งคุณถึงเวลาที่ต้องมารับการฉีดยาที่ห้องทำงานแพทย์หรือคลินิก เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องไม่พลาดนัดในการบริหารยา ถ้าคุณไม่สามารถมาตามนัดเพื่อพบแพทย์ได้ ให้คุณทำการแจ้งแพทย์โดยทันทีเพื่อที่จะทำการนัดครั้งถัดไปได้โดยเร็วที่สุด

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา จะถูกบริหารโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน หรือ แก้มก้น คุณจะรับประทาน อินวีก้า ซัสเทนนา ครั้งที่ 1 (150 มิลลิกรัม) และครั้งที่ 2 (100 มิลลิกรัม) เป็นเวลาห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น คุณจะรับประทาน (อยู่ในช่วงระหว่าง 25-150 มิลลิกรัม) เดือนละ 1 ครั้ง แพทย์จะทำการเพิ่มหรือลดขนาดของยาที่คุณจะได้รับในนัดแต่ละครั้งโดยจะขึ้นอยู่กับอาการของคุณ

ถ้าคุณรับประทานอินวีก้า ซัสเทนนา มากกว่าขนาดที่ต้องการ

คุณจะได้รับยาตัวนี้ภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะได้รับยามากเกินไป

ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาลีเพอริโดนมากเกินไปอาจเกิดอาการดังต่อไปนี้ มีอาการซึมหรือง่วงนอน หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ (การตรวจสอบทางไฟฟ้าของหัวใจ) หรือ เชื่องช้า หรือ การเคลื่อนไหวผิดปกติที่บริเวณใบหน้า ลำตัว แขนหรือขา

ถ้าคุณหยุดยาอินวีก้า ซัสเทนนา

คุณจะสูญเสียประสิทธิภาพของยา ไม่ควรหยุดยานี้ยกเว้นแพทย์เป็นคนบอกให้หยุด เพราะอาการของคุณ อาจกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

เด็กและวัยรุ่น

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ไม่ใช่สำหรับรักษาโรคจิตเภทในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางไตและตับ

แพทย์จะเป็นคนปรับขนาดยาอินวีก้า ซัสเทนนา โดยขึ้นกับค่าการทำงานของไต ไม่มีเคยมีการศึกษาการใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางตับ แต่ตามที่เคยพบในยาพาลีเพอริโดนรูปแบบรับประทาน พบว่าไม่จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาในผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางตับขั้นเล็กน้อยหรือปานกลาง แพทย์จะเป็นคนใช้วิจารณญาณในการพิจารณาการใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา ในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางตับขั้นรุนแรง



ผลอันไม่พึงประสงค์

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้เช่นเดียวกับยาทุกตัว แต่อาการเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย

ปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ มีไข้ มีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น มีอาการหายใจลำบาก มีอาการคัน ผื่นหรือเป็นผื่น และ บางครั้งมีภาวะความดันโลหิตลดต่ำลง (เทียบเท่ากับ 'ปฏิกิริยาแอนาฟิแลคติก (anaphylactic reaction)') เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบไม่บ่อยที่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้ามีอาการดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

ถึงแม้ว่าคุณจะเคยทนต่อยาพาลีเพอริโดนหรือริสเพอริโดนรูปแบบรับประทาน ปฏิกิริยาการแพ้หลังจากฉีดยาอินวีก้า ซัสเทนนามีการเกิดขึ้นแต่พบได้น้อยมาก (very rarely) ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการผื่นหรือเป็นผื่น บวมบริเวณลำคอ มีอาการคัน หรือ มีปัญหาด้านการหายใจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาการแสดง (sign) ของปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง

ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ยาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาอินวีก้า ซัสเทนนา มีความสัมพันธ์กับอาการข้างเคียงต่อไปนี้ มีภาวะอ่อนแรงทันทีทันใด หรือ มีอาการชาบริเวณใบหน้า แขนหรือขา มีอาการพูดคำคละละเลื้อน (slurred speech) หรือ มองเห็นภาพซ้อน อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ถ้ามีอาการดังกล่าวแม้จะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

ถ้าเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้น หรือเกิดอาการข้างเคียงอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร

อาการที่พบบ่อยมาก (Very Common) (เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ใน 10 คน) ประกอบด้วย:

นอนหลับหรือคงการนอนหลับยาก

ปวดศีรษะ

อาการที่พบบ่อย (Common) (เกิดขึ้น 1 ใน 10 คน ใน 100 คน) ประกอบด้วย:

เป็นไข้หวัด; ติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ; มีความรู้สึกเหมือนเป็นไข้

พาลีเพอร์โดนสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนชื่อว่า “โปรแลคติน” โดยสามารถพบได้โดยการตรวจเลือด (ซึ่งอาจจะส่งผลหรืออาจไม่ส่งผลต่อการเกิดอาการขึ้น) เมื่อภาวะโปรแลคตินสูงเกิดขึ้น จะมีอาการต่อไปนี้ (ในเพศชาย) เต้านมโต การทำให้องค์ชาติแข็งตัวหรือคงการแข็งตัวยากขึ้น หรือ มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ; (ในเพศหญิง) มีอาการคัดเต้านม มีอาการน้ำนมไหล ประจำเดือนขาด หรือ ปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับรอบประจำเดือน

ระดับน้ำตาลในเลือดสูง; น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น; น้ำหนักตัวลดลง; ระดับไตรกลีเซอไรด์ (ไขมัน) ในเลือดสูง

มีความหงุดหงิด; ภาวะซึมเศร้า; มีความวิตกกังวล

กลุ่มอาการพาร์กินสันโซนิซึม (parkinsonism) (ภาวะนี้อาจรวมถึงการเคลื่อนไหวช้าหรือบกร่อง มีความรู้สึกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือรัดแน่น (เกิดการเคลื่อนไหวแบบกระตุก) และบางครั้งมีความรู้สึกขยับตัวไม่ได้ (freezing up) และเริ่มขยับตัวได้ใหม่ อาการอย่างอื่นของกลุ่มอาการพาร์กินสันโซนิซึม ได้แก่ เดินลากเท้าแบบช้าๆ มีอาการสั่นขณะพัก น้ำลายเพิ่มขึ้น และ/หรือ น้ำลายไหล และ สูญเสียการแสดงออกทางใบหน้า)

ภาวะกล้ามเนื้อตึงผิดปกติ (dystonia) (ภาวะนี้รวมถึงกล้ามเนื้อหดตัวช้าหรือหดตัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ มันสามารถเกี่ยวข้องกับส่วนใดๆในร่างกาย (และอาจส่งผลให้มีท่าทางที่ผิดปกติ) ภาวะกล้ามเนื้อตึงผิดปกติ (dystonia) มักจะพบที่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า รวมทั้งความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของดวงตา ปาก ลิ้น หรือ ขากรรไกร)

อาการยึกยือเหตุดยา (dyskinesia) (ภาวะนี้รวมถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ และรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าๆ หดเกร็ง หรือ บิดงอ หรือการกระตุก)

มีความกระสับกระส่าย; รู้สึกง่วงนอน หรือ มีความตื่นตัวลดลง; มีอาการเวียนศีรษะ; มีอาการสั้น

หัวใจเต้นช้า; หัวใจเต้นเร็ว

ความดันโลหิตสูง

ไอ; คัดจมูก

ปวดหรือไม่สบายท้อง; อาเจียน; คลื่นไส้; ท้องผูก; ท้องเสีย; การย่อยอาหารไม่ดี; ปวดฟัน

ระดับเอนไซม์ทรานซามิเนส (transaminases) ของตับในเลือดเพิ่มขึ้น

ผิวหนังเป็นผื่น

ปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ; ปวดหลัง

มีไข้; มีภาวะอ่อนแรง; มีความล้า (มีความเหนื่อย); เกิดปฏิกิริยาบริเวณที่มีการฉีดยา ประกอบด้วย อาการคัน ปวด หรือ บวม

พบไม่บ่อย (Uncommon) (เกิดขึ้น 1 ใน 10 คน ใน 1,000 คน) ประกอบด้วย:

โรคปอดบวม; ติดเชื้อในทรวงอก (หลอดลมอักเสบ); ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ; การติดเชื้อบริเวณไซนัส; การติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ; ติดเชื้อที่หู; ติดเชื้อบริเวณดวงตา; ทอนซิลอักเสบ; การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง; ผิวหนังอักเสบโดยมีสาเหตุจากตัวไร (mites); มีหนองใต้ผิวหนัง

จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง; โลหิตจาง; จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง; จำนวนอีโอซิโนฟิล (เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง) ในเลือดเพิ่มขึ้น

ปฏิกิริยาการแพ้

เบาหวานหรือเบาหวานที่มีอาการแยลง; ระดับอินซูลิน (ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด) ในเลือดเพิ่มขึ้น; ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น; สูญเสียความอยากอาหารส่งผลให้มีภาวะขาดสารอาหาร และ น้ำหนักตัวน้อย; ความอยากอาหารลดลง; ระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น

มีปัญหาด้านการนอนหลับ; อารมณ์ร้ายแรง (ภาวะฟุ้งฟ่วน); มีภาวะงุนงง; ความต้องการทางเพศลดลง; ผื่นร้าย

Tardive dyskinesia (การเคลื่อนไหวแบบกระตุกซ้ำๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริเวณใบหน้า ลิ้น หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย) ริมแฉกแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะที่ลิ้น ปาก และใบหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจจำเป็นต้องหยุดการใช้ยาอินวิกา ซัสเทนนา

การชัก; เป็นลม; อาการอยู่ไม่นิ่งที่ต้องการที่จะเคลื่อนไหวส่วนของร่างกาย; มีอาการเวียนศีรษะในขณะยืน; ขาดความใส่ใจ; มีปัญหาด้านการพูด; สูญเสียหรือมีความผิดปกติด้านการรับรส; ลดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดหรือการสัมผัสบริเวณผิวหนัง; มีความรู้สึกเป็นเหน็บ คล้ายถูกเข็มตำ หรือ ชาบริเวณผิวหนัง

มองเห็นภาพซ้อน; ตีตเชื่อบริเวณดวงตา หรือ “โรคตาแดง”; ตาแห้ง

มีความรู้สึกหมุน (อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo)); มีเสียงดังในหู; ปวดหู

หัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ); มีการขัดขวางการนำไฟฟ้าระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่าง; เกิดความผิดปกติในระบบการนำไฟฟ้าหัวใจ; คลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วง QT ยาวขึ้น; หัวใจเต้นเร็วในขณะที่เย็น; เกิดความผิดปกติในการตรวจสอบไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram หรือ ECG); มีความรู้สึกสั่นระรัวหรือตุบๆบริเวณทรวงอก (อาการใจสั่น)

ความดันต่ำ; ความดันโลหิตลดลงในขณะที่เย็น (เพราะฉะนั้น บางคนที่ได้รับยาอินทรีก้า ชันเทนนา อาจรู้สึกหน้ามืด เวียนศีรษะ หรืออาจจะเป็นลมระหว่างที่มีการยืนหรือนั่งอย่างกะทันหัน)

มีอาการหายใจลำบาก; เลือดคั่งในปอด; หายใจมีเสียงหวีด; เจ็บคอ; เลือดกำเดาไหล

ตีตเชื่อกักระเพาะหรือลำไส้; ปากแห้ง; ผายลมมากกว่าปกติ

ระดับ GGT (เอนไซม์ตับที่มีชื่อว่า gamma-glutamyltransferase) ในเลือดเพิ่มขึ้น; ระดับเอนไซม์ตับในเลือดเพิ่มขึ้น

ลมพิษ (หรือ “ผื่นแพ้ตำแย (nettle rash)"); มีอาการคัน; ผม่วรง; ผิวหนังอักเสบ; ผิวหนังแห้ง; ผิวหนังแดง; เป็นสิ่ว

กล้ามเนื้อหดเกร็ง; ภาวะข้อต่อฝืด; ปวดคอ; ปวดข้อต่อ

กลั้วบัสสาวะไม่ได้; บัสสาวะบ่อย; มีอาการปวดเมื่อกำลังบัสสาวะ

ภาวะการแข็งตัวขององคชาติที่ผิดปกติ; มีความผิดปกติของการหลั่งน้ำอสุจิ; ประจำเดือนขาด; ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด; มีภาวะประจำเดือนขาดหรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับรอบประจำเดือน (ในเพศหญิง); เต้านมโตในเพศชาย; มีอาการน่านมไหล; หย่อนสมรรถภาพทางเพศ; คัดแน่นเต้านม; มีอาการตกขาว

มีอาการบวมที่ใบหน้า ปาก ตา หรือ ริมฝีปาก; มีอาการบวมที่ลำตัว แขน หรือ ขา; การเดินมีการเปลี่ยนแปลงไป; ไม่สบายหน้าอก; รู้สึกไม่สบาย; ผิวหนังหนาขึ้น

หกลั้ว

พบน้อย (Rare) (เกิดขึ้น 1 ใน 10 คน ใน 10,000 คน) ประกอบด้วย:

การติดเชื้อมัลเลียเรีย

เม็ดเลือดขาวบางประเภทที่มีความจำเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อมีจำนวนลดลง; จำนวนเกล็ดเลือดลดลง (เซลล์ในเลือดที่ทำให้เลือดหยุดไหล)

มีความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณปัสสาวะ

ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ; ตื่นน้ำมากเกินไป

ไม่เคลื่อนไหวหรือตอบสนองขณะตื่น (catatonia) เดินละเมอ

ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศได้

กลุ่มอาการ Neuroleptic malignant syndrome (มีภาวะง่วงงม ลดหรือสูญเสียความรู้สึกตัว มีไข้สูง และ กล้ามเนื้อแข็งเกร็งขึ้นรุนแรง)

สูญเสียเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเฉียบพลัน (โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ สมองขาดเลือดชั่วคราว (mini stroke)); ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า; สูญเสียความรู้สึกตัว; ความรู้สึกตัวอยู่ในระดับต่ำ; มีปัญหาด้านการทรงตัว

มีปัญหากการเคลื่อนไหวดวงตา; อาการตาถลอก; ดวงตามีความไวต่อแสงมากเกินไป; มีน้ำตาเพิ่มขึ้น; มีอาการตาแดง

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา; มีอาการหน้าแดง

เลือดคั่งบริเวณทางเดินหายใจ

ตับอ่อนอักเสบ; ลึ้นบวม; กลั้นอุจจาระไม่ได้; อุจจาระแข็งมาก; กลืนลำบาก

มีผื่นบนผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับยา; ผื่นหงิกหงิก; มีรังแค

มีการเพิ่มขึ้นของ CPK (ครีเอทีน ฟอสโฟไคเนส (creatine phosphokinase)) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการสลายของกล้ามเนื้อในกระแสเลือด; บวมที่บริเวณข้อต่อ; กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปัสสาวะไม่ออก

มีการขยายขนาดของต่อมบริเวณเต้านม; หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น; มีอาการน้ำนมไหล

อุณหภูมิร่างกายต่ำมาก; รู้สึกหนาวและสั่น; อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น; รู้สึกกระหายน้ำ; มีหนองสะสมสาเหตุมาจากติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยา; ติดเชื้อบริเวณผิวหนังส่วนลึก; มีรอยฟกช้ำบริเวณที่ฉีดยา

พบน้อยมาก (Very Rare) (เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 ใน 10,000 คน) ประกอบด้วย:

ปฏิกิริยาการแพ้ ถึงแม้ว่า คุณจะเคยทนต่อยาพาลีเพอริโดนหรือริสเพอริโดนรูปแบบรับประทาน

ขาดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลำไส้ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน

ไม่ทราบความถี่ (Frequency not known) (ไม่สามารถประเมินความถี่ได้จากข้อมูลที่มีอยู่):

เม็ดเลือดขาวบางประเภทที่มีความจำเป็นในการต่อสู้กับการติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างน่าอันตราย

ปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ มีไข้ มีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น มีอาการหายใจลำบาก มีอาการคัน ผิวกายเป็นผื่น และ บางครั้งมีภาวะความดันโลหิตลดต่ำลง

พบน้ำตาลในปัสสาวะ

ดื่มน้ำมากเกินไปอย่างเป็นอันตราย; เกิดอาการข้างเคียงจากโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ภาวะขาดอารมณ์; ละเมอกินขณะหลับ

มีปัญหาที่หลอดเลือดในสมอง; โคม่าเนื่องจากโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้; การประสานงานผิดปกติ

มีการสั่นของศีรษะ

ต้อหิน (ความดันภายในลูกตาเพิ่มขึ้น)

มีปัญหาคือดวงตาขณะผ่าตัดต่อกระจก ระหว่างการผ่าตัดต่อกระจก สามารถเกิดภาวะที่เรียกว่าม่านตาย้วยโป่งทะลุแผลผ่าตัด (intraoperative floppy iris syndrome, IFIS) ขึ้นได้ถ้าคุณได้รับยาอินวิกา ซัสเทนนา ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดต่อกระจกให้แจ้งจักษุแพทย์ว่าคุณได้รับยาอินวิกา ซัสเทนนา ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด; ปริมาณออกซิเจนในร่างกายลดลง (เนื่องมาจากระบบไหลเวียนเลือดลดลง)

มีปัญหาด้านการหายใจระหว่างนอนหลับ (หยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea)); หายใจเร็วและหายใจตื้น; โรคปอดบวมมีสาเหตุมาจากการสูดดมอาหาร; มีเสียงแฉมหายใจ; เสียงผิดปกติ

มีการอุดตันภายในลำไส้; ริมฝีปากแตก

มีอาการผิวหนังและตาเหลือง (ดีซ่าน)

ปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรงพร้อมกับอาการบวมซึ่งรวมถึงบริเวณลำคอ ซึ่งส่งผลให้หายใจลำบาก; ผิวหนังเปลี่ยนสี

การสลายของเส้นใยกล้ามเนื้อ และ ปวดบริเวณกล้ามเนื้อ (Rhabdomyolysis); มีความผิดปกติของท่าทางในทารกแรกเกิดผู้ซึ่งแม่ได้รับยาพาลิเพอริโดนในระหว่างตั้งครรภ์อาจจะมีอาการชักเกร็งจากยาและ/หรืออาการถอนยา เช่น มีความไวเกินต่อการกระตุ้น กล้ามเนื้อหดตัวซ้ำหรือหดตัวอย่างต่อเนื่อง มีอาการสั่น มีอาการง่วงนอน มีปัญหาด้านการหายใจ หรือ มีความลำบากในการกินอาหาร

ภาวะองคชาติแข็งค้าง (ภาวะองคชาติแข็งตัวนานซึ่งอาจต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด)

อุณหภูมิร่างกายลดลง; กลุ่มอาการถอนยา; มีซีสต์บริเวณที่ฉีดยา; เซลล์ผิวหนังตายบริเวณที่ฉีดยา; เป็นแผลบริเวณที่ฉีดยา



การได้รับยาเกินขนาด

เนื่องจากยาอินวิกา ซัสเทนนา ได้ถูกจัดเก็บและบริหารยาโดยบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความเป็นไปได้น้อยในการเกิดการได้รับยาเกินขนาดในผู้ป่วย

ในกรณีที่รับประทานเกินขนาด อาจเกิดอาการแสดง (signs) อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ ความรู้สึกตัวลดลง มีอาการซีม มีอาการร่งงนอน มีอาการสั่นมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อแข็งเกร็งมากกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตต่ำ มีการรายงานเกิดความผิดปกติในระบบการนำไฟฟ้าหัวใจ (คลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วง QT ยาวขึ้น (QT prolongation)) และการเกิดอาการชัก สามารถเกิดการรับประทานเกินขนาดได้ถ้าคุณใช้ยาตัวอื่นร่วมกับยาอินวีก้า ซัสเทนนา ถ้าคุณมีอาการแสดงดังที่กล่าวไปข้างต้นให้ติดต่อแพทย์เพื่อที่จะสามารถรับการรักษาในกรณีที่รับประทานยาอินวีก้า ซัสเทนนา ในขนาดที่มากเกินไป

ข้อมูลสำหรับแพทย์ในกรณีรับประทานเกินขนาด

- ทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก ถ้าผู้ป่วยสูญเสียความรู้สึกตัว
- ฉีดยาในกลุ่ม **sympathomimetic** ในกรณีที่ความดันโลหิตต่ำ
- จำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตาม ECG : พิจารณาให้มีการย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาล



การเก็บรักษายาอินวีก้า ซัสเทนนา

เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยาอินวีก้า ซัสเทนนา หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน

ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส

ไม่ควรกำจัดยาผ่านระบบน้ำเสียหรือขยะของครัวเรือน โปรดตามสอบเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ วิธีการจัดการเหล่านี้จะช่วยป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม



ส่วนประกอบของยาอินวีก้า ซัสเทนนา

ตัวยาสำคัญที่อยู่ในยาอินวีก้า ซัสเทนนา คือ พาลีเพอริโดน (ในรูป พาลีเพอริโดน พาลมิเตท)

ยาอินวีก้า ซัสเทนนา อยู่ในลักษณะ น้ำยาแขวนตะกอนขาวหรือสีออกขาวบรรจุในไซริงค์พร้อมฉีดยา สำหรับใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยมีรายละเอียดความแรงดังนี้:

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท 39 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ พาลีเพอริโดน 25 มิลลิกรัม

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท 78 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ พาลีเพอริโดน 50 มิลลิกรัม

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท 117 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ พาลีเพอริโดน 75 มิลลิกรัม

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท 156 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ พาลีเพอริโดน 100 มิลลิกรัม

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท 234 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ พาลีเพอริโดน 150 มิลลิกรัม

สารประกอบอื่นๆ: citric acid monohydrate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, polyethylene glycol 4000, polysorbate 20, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide (สำหรับปรับค่าพีเอช (pH)), น้ำสำหรับยาฉีด (water for injection)

Manufactured by	Marketing Authorization Number	Date of Authorization
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Kingdom of Belgium	1C 21/54 (N)	7 June 2011
Cilag AG Schaffhausen, Switzerland	1C XX/XX (N)	DD MMM YYYY

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด: 05 พฤษภาคม 2564 (CCPI V 07 May 2018)

สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งว่าคุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่ เพราะมียาบางตัวที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยาตัวนี้

ยาตัวนี้ได้ถูกทดสอบเป็นอย่างดีก่อนหน้าที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วย จึงควรมีโอกาสน้อยที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดขึ้นถ้ามีการใช้ยาอย่างถูกต้อง ซึ่งถ้าคุณใช้ดังต่อไปนี้:

- ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้รับเท่านั้น;
- ในปริมาณที่แนะนำเท่านั้น;
- ในช่วงระยะเวลาที่แนะนำเท่านั้น

เก็บยาทุกตัวให้พ้นจากมือเด็ก

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ และอย่าใช้ยาของคนอื่น

เก็บยาทุกตัวในบรรจุภัณฑ์เดิมและเก็บในที่แห้ง (ตัวอย่างเช่น อย่าเก็บยาในห้องน้ำ!)

ให้สร้างนิสัยในการนำยาที่ไม่ได้ใช้หรือยาเก่าไปคืนกับเภสัชกร

ถ้าเกิดบางคนได้รับยาเกินขนาด ให้ทำการแจ้งแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยา

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 02-792-7200

โทรสาร:02-792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>