

ลิวีโทราซีแอม
ความแรง 250, 500 มิลลิกรัม
ชนิด เม็ด
ชื่อการค้า LEVETAM (เลเวแอม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลิวีโทราซีแอม (Levetiracetam)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้นานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มอนุพันธ์ของไพริโรลิโดน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้นานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท่านเป็นโรคไต
 - บุตรของท่านโตช้า หรือมีพัฒนาการทางเพศผิดปกติ
 - เคยได้รับยากันชักแล้วมีอาการซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
 - ท่านกำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรอื่นร่วมด้วย
 - ท่านกำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลยาฉบับย่อ
หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมโปรด
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับการกินก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้ออกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- ให้รีบแจ้งแพทย์ หากได้รับยาแล้วยังมีอาการชักอยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผื่นบนใบหน้าแล้วลุกลามตามลำตัว ร่วมกับมีไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต
- บัสสาวะไม่ออก บวมที่ขา-ข้อเท้า หน้าหนักขึ้นเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
- อารมณ์แปรปรวน สับสน ง่วงนอนมากผิดปกติ หลงลืม เดินลำบาก มือสั่น

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- โพรงจมูกและคอหอยอักเสบ ปวดหัว
 - เบื่ออาหาร
 - ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ตื่นกลัว หงุดหงิดง่าย
 - บ้านหมุน มึนงง
 - ปวดท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย อาเจียน
 - คลื่นไส้ ไอ
 - อาการแพ้
 - น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
 - ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อ มีความรู้สึกเป็นเหน็บ
 - ผมรั้ง อาการคันบนผิวหนัง
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา เลเวแอม (250 มิลลิกรัม)** เม็ดรูปรีเคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง และมีอักษร "L" อยู่ด้านซ้ายและอักษร "T" อยู่ด้านขวาของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักษร "250"
- **เลเวแอม (500 มิลลิกรัม)** เม็ดรูปรีเคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง และมีอักษร "L" อยู่ด้านซ้ายและอักษร "T" อยู่ด้านขวาของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักษร "500"
- **ตัวยาสําคัญ** ลิวีโทราซีแอม (levetiracetam)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส), copovidone

(โคโพรโอดิน), talcum (ทัลคัม), colloidal silicon dioxide (คอลลอยด์ซิลิกอนไดออกไซด์), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท)

ส่วนประกอบของสารเคลือบเม็ดยา

เลเวแหมม (250 มิลลิกรัม) polyvinyl alcohol (โพลีไวนิล แอลกอฮอล์), titanium dioxide (ไทเทเนียมไดออกไซด์), talcum (ทัลคัม), glyceryl monostearate (กลีเซอรอล โมโนสเตียเรท), sodium lauryl sulfate (โซเดียม ลอริล ซัลเฟต), indigo carmine aluminium lake (อินดิโกคาร์มีน อะลูมิเนียม เลค), ferric oxide red (เฟอร์ริกออกไซด์ เรด)

เลเวแหมม (500 มิลลิกรัม) polyvinyl alcohol (โพลีไวนิล แอลกอฮอล์), titanium dioxide (ไทเทเนียมไดออกไซด์), talcum (ทัลคัม), polyethylene glycol (โพลีเอทิลีน ไกลคอล), ferric oxide yellow (เฟอร์ริกออกไซด์ เยลโลว์)

ผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ธันวาคม พ.ศ.
2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลยาฉบับย่อ
หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมโปรด
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน**

คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

1. ยานี้อาจทำให้ท้องอืด จึงไม่ควรขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต