

ไบมาโทพรอสต์ ความแรง 0.1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร ชนิด ยาหยอดตา BIMA-OPT (ไบมา-ออปท์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไบมาโทพรอสต์ (Bimatoprost) เป็นยาในกลุ่มยาพรอสตาแกลนดิน อะนาล็อก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับลดความดันในลูกตาและรักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยหยุดใช้ยาหยอดตา เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงจากสารกันเสีย เบนซาลโคเนียม คลอไรด์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 - มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
 - เคยรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัด
 - มีปัญหาตาแห้ง
 - มีปัญหาหรือเคยมีปัญหากับกระจกตา
 - สวมใส่คอนแทคเลนส์
 - มีหรือเคยมีปัญหาคความดันโลหิตต่ำ หรือหัวใจเต้นช้า
 - เคยติดเชื้อไวรัส หรือมีการอักเสบบริเวณดวงตา
 - วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่
 - วางแผนที่จะให้นมลูก หรือกำลังให้นมลูก
 - เป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ตรวจสอบสภาพของขวดยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ หากน้ำยาขุ่นหรือขุ่น
 - อย่าใช้ยานี้ หากภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
3. นอนหงาย หรือเงยหน้าขึ้น แล้วหยอดยาตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1 หยด วันละ 1 ครั้ง ในตอนเย็น

4. ขณะใช้ยาหยอดตา ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณปลายหลอดหยดสัมผัสกับดวงตา ขนตา มือ หรือสิ่งอื่น ๆ

5. หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรใช้ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้จะถึงเวลาหยอดตาครั้งต่อไป ให้รอหยอดครั้งต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนหยดหรือจำนวนครั้งการหยอดตา

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง และสามารถสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้ หลังจากหยอดตาไปแล้วอย่างน้อย 15 นาที
- งดการขับชียานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา จนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ตามปกติ **เพราะ** ยานี้ อาจจะทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว
- หากใช้ยานี้แล้ว อาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ความดันโลหิตสูง
- การมองเห็นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ
- ตาแห้ง ตาแดง คันบริเวณตาหรือเปลือกตา
- ขนตายาวหรือหนาขึ้น ผิวหนังรอบดวงตามีสีเข้มขึ้น
- ระคายเคืองตา แสบตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หลังจากเปิดใช้งานครั้งแรก ยาจะมีอายุ 30 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสําคัญ** ไบมาโทพรอสต์
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** โซเดียมคลอไรด์ ไดเบสิก โซเดียมฟอสเฟต กรดซิตริก เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ น้ำ โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก

ผู้ผลิต บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด

1/38 หมู่ 4 ถนนเลียบบคลองเจ็ด ต.บึงคำพร้อย

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-9715335 แฟกซ์ 02-9715470

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>