

เบรซพิพลาโซล

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า REXULTI (เรซัลที)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบรซพิพลาโซล (Brexpiprazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่
- ยานี้ใช้เพื่อใช้รักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
- แจ้งแพทย์หากมีระดับไขมันในเลือดสูง
- แจ้งแพทย์หากมีความดันเลือดต่ำหรือสูง
- แจ้งแพทย์หากมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบ แจ้งแพทย์หากเคยมีอาการชัก
- แจ้งแพทย์หากมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
- แจ้งแพทย์หากเคยคิดฆ่าตัวตาย
- แจ้งแพทย์หากครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานหรือหลอดเลือดสมองตีบ
- **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านต้องใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด** เช่น ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยาต้านโรคซึมเศร้าบางชนิด และสมุนไพรบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกลืนยาทั้งเม็ด **ห้าม** หัก บด เคี้ยว หรือละลายเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าข้ามวันแล้วให้รอกินยามื้อต่อไป
- ห้ามกินยาเป็นสองเท่า เพื่อชดเชยมื้อที่ลืม

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาตรงเวลาตามแพทย์สั่ง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ยานี้อาจทำให้ง่วง ดังนั้นเลี่ยงขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ใช้สูง กล้ามเนื้อเกร็ง สับสน เหงื่อออกมาก ใจสั่น
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ บริเวณใบหน้า ลิ้น กราม
- มีความหิวหรือกระหายน้ำที่เพิ่มขึ้น บัสสาวะบ่อยขึ้น
- อาการซึมเศร้าที่แย่ลง มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง

"หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว
- น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ควรเก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมาเพื่อป้องกันแสงและความชื้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีตัวยาสำคัญ คือ เบรซพิพลาโซล

- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต, แป้งข้าวโพด, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, แมกนีเซียมสเตียเรท, ไฮโปเมลโลส, ทาลคัม, ไททาเนียมไดออกไซด์, เพอร์ริกออกไซด์, เพอร์โรโซเพอร์ริกออกไซด์

- ยานี้มี 6 ความแรงแต่ละความแรงมีสีและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

- ยาเม็ดสีน้ำตาลอ่อน : มีตัวยาขนาด 0.25 มิลลิกรัม มีตัวอักษร "BRX" และ "0.25"บนเม็ดยา

- ยาเม็ดสีส้มอ่อน : มีตัวยาขนาด 0.5 มิลลิกรัม มีตัวอักษร "BRX" และ "0.5"บนเม็ดยา

- ยาเม็ดสีเหลืองอ่อน : มีตัวยาขนาด 1 มิลลิกรัม มีตัวอักษร "BRX" และ "1"บนเม็ดยา

- ยาเม็ดสีเขียวอ่อน : มีตัวยาขนาด 2 มิลลิกรัม มีตัวอักษร "BRX" และ "2"บนเม็ดยา

- ยาเม็ดสีม่วงอ่อน : มีตัวยาขนาด 3 มิลลิกรัม มีตัวอักษร "BRX" และ "3"บนเม็ดยา

- ยาเม็ดสีขาว: มีตัวยาขนาด 4 มิลลิกรัม
มีตัวอักษร "BRX" และ "4" บนเม็ดยา

ผู้ผลิต: บริษัท โอซูกา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด,
โทคุชิมะ แพคตอรี

ผู้นำเข้า: บริษัทไทยโอซูกา จำกัด ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

