

# ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

## Gaviscon Double Action Mint (กาวิสคอน ดับเบิล แอคชั่น มินต์) ชนิดน้ำแขวนตะกอน

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาไซเตียมแอลจินेट 500 มิลลิกรัม, โซเดียมไบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เขย่าขวด/ซองก่อนใช้ยา

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่ม 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และ เอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวน้ำหรือเลือดออกผิดปกติ

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่ควรเก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** ยาน้ำแขวนตะกอนขุ่น สีขาวออกครีม กลิ่นเปปเปอร์มินต์
- มีตัวยาสำคัญ ได้แก่ โซเดียมอัลจินेट, โซเดียมไบคาร์บอเนต และ แคลเซียมคาร์บอเนต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ คาร์โบเมอร์, เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต, โพรพิลพาราเบนโซเอต, แซคคาไรนโซเดียม, สารแต่งกลิ่นเปปเปอร์มินต์ และ โซเดียมไฮดรอกไซด์
- **ผู้ผลิต** Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, สหราชอาณาจักร
- **ผู้นำเข้า** บริษัท เรคคิทท์ เบนคิเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ <เดือนปีที่ได้รับอนุมัติทะเบียน>

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร