

**แคลเซียมคาร์บอเนต****ความแรง 835 และ 1000 มิลลิกรัม****ชนิดเม็ด****ชื่อการค้า****CALTAB 835 และ CALTAB 1000****แคลแทบ 835 และ แคลแทบ 1000)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) เป็นยาในกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะขาดแคลเซียม เป็นยาเสริมในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน เป็นอาหารเสริมเมื่อได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และให้นมลูก ใช้เป็นตัวจับฟอสเฟตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง และเป็นยาลดกรด

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา****2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เนื่องจากภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน ภาวะวิตามินดีเกิน มะเร็งไขกระดูก หรือโรคซาร์คอยด์
- มีภาวะไตบกพร่องรุนแรงที่ไม่ได้ทำการล้างไต
- มีภาวะแคลเซียมในปัสสาวะสูง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
  - ภาวะไตบกพร่องและแคลเซียมในปัสสาวะสูง
  - ชนิดไม่รุนแรง

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต ยาโซเดียมฟลูออไรด์ ยาฆ่าเชื้อ (เช่น เตตราไซคลิน ดีโดโคนาโซล ไอทราโคนาโซล ควิโนโลน) วิตามินดี ยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

**3. วิธีใช้ยา****3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาพร้อมอาหาร

**3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร**

- ไม่ต้องกินยามื้อนั้นให้รอกินยาของมื้อต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ทนไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบหรือเกิดอาการขาดยาได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา****5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง
- "ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น**

- คลื่นไส้ ท้องอืด ท้องผูก ท้องเสีย ปวดท้อง
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- นำยาออกจากภาชนะบรรจุเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้****• ลักษณะของยา**

- แคลแทบ 835 ยาเม็ดกลม นูน สีขาว ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
- แคลแทบ 1000 ยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร "CALTAB" อีกด้านหนึ่งเรียบ

**• ตัวอย่างคำขวัญ แคลเซียมคาร์บอเนต**

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ปริเจลาดินไนซ์สตาร์ช, คอโรนสตาร์ช, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสพีเอช 301, โซเดียมลอริลซัลเฟต, พีอีจี 6000, น้ำ, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย : บริษัท มิลลิเมต จำกัด 193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 Call center 0 2461 1027

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 พฤษภาคม 2566 ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร