

**ไบมาโทพรอสต์**  
**ความแรง 0.3 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร**  
**ชนิด ยาหยอดตา**  
**ชื่อการค้า Bimato (ไบมาโท)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไบมาโทพรอสต์ (Bimatoprost) เป็นยาในกลุ่มพรอสตาแกลนดิน อะนาล็อก

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้สำหรับลดความดันภายในลูกตาและรักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เคยหยุดใช้ยาหยอดตา เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงจากสารกันเสีย เบนซาอิลโคเนียม คลอไรด์

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  - มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
  - **เคย**รักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัด
  - มีปัญหาตาแห้ง
  - มีปัญหาหรือเคยมีปัญหากับกระจกตา
  - สวมใส่คอนแทคเลนส์
  - มีปัญหาหรือเคยมีปัญหาคความดันโลหิตต่ำหรือหัวใจเต้นช้า
  - **เคย**ติดเชื้อไวรัสหรือมีการอักเสบบริเวณดวงตา
  - วางแผนจะตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่
  - วางแผนจะให้นมลูกหรือกำลังให้นมลูก
  - เป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- **วิธีใช้ยาหยอดตา**
  1. ล้างมือให้สะอาด
  2. ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
    - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีสีหรือขุ่น
    - อย่าใช้ยานี้หากภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
  3. นอนหงายหรือเงยหน้าขึ้น แล้วหยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1 หยด วันละ 1 ครั้งใน**ตอนเย็น**
  4. ขณะใช้ยาหยอดตา ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณปลายหลอดหยอดสัมผัสกับดวงตา ขนตา มือหรือสิ่งอื่น ๆ
  5. หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรใช้ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที

**3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร**

- ให้หยุดตาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้จะถึงเวลาที่จะหยอดตาครั้งต่อไป ให้รอหยอดตาครั้งต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนหยดหรือจำนวนครั้งการหยอดตา

**3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบล้างออกด้วยน้ำอุ่น สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบพบแพทย์ทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ถอดคอนแทคเลนส์ ก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง และสามารถสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้หลังจากหยอดตาไปแล้วอย่างน้อย 15 นาที
- งดยาขับขี้นานพาทนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาจนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ตามปกติ **เพราะยานี้**อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว
- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ความดันโลหิตสูง
- การมองเห็นที่ผิดปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดศีรษะ
- ตาแห้ง ตาแดง คันบริเวณตาหรือเปลือกตา
- ขนตายาวหรือหนาขึ้น ผิวนิ่งรอบดวงตามีสีเข้มขึ้น
- ระคายเคืองตา แสบตา

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก ยาจะมีอายุ 28 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** ไบมาโทพรอสต์
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ เบนซาลโคเนียม คลอไรด์, ซิตริกแอซิด โมโนไฮเดรต, ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต เฮปตะไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียม-ไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก และน้ำกลั่นสำหรับฉีด

**ผู้ผลิต** บริษัท Rafarm S.A., ประเทศกรีซ

**ผู้นำเข้า** บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มิถุนายน 2564

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>