

## อะทีโซลิซูแมบ

ชนิดสารละลายเข้มข้นสำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำขนาด 60 มิลลิกรัม ใน 1 มิลลิลิตร และชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังขนาด 125 มิลลิกรัม ใน 1 มิลลิลิตร ชื่อการค้า Tecentriq (ทีเซนทริค)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะทีโซลิซูแมบ (atezolizumab) เป็นยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกันต้านทาน

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ตามที่แพทย์เห็นสมควร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอด ตามที่แพทย์เห็นสมควร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเต้านม ตามที่แพทย์เห็นสมควร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งตับ ตามที่แพทย์เห็นสมควร

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากภาวะต่อไปนี้ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับยานี้

- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้น้ำนมลูก หรือมีแผนจะให้น้ำนมลูก
- ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- เคยปลูกถ่ายอวัยวะ
- โรคปอด หรือการหายใจ
- โรคตับ

- โรคระบบประสาท
- กำลังรักษาอาการติดเชื้อใดๆ อยู่

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

### 3.2 หากลืมไปฉีดยา ควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมนัด ให้ท่านติดต่อแพทย์โดยด่วนเพื่อปรับตารางการให้ยาใหม่

### 3.3 ถ้าฉีดยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ป่วยหญิงให้คุมกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา
- หยุดให้นมลูกระหว่างได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ หรืออาการไอเรื้อรังที่ไม่ดีขึ้น หายใจสั้น เจ็บหน้าอก
- ตัวเหลืองตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง เจ็บชายโครงขวา เชื้ออัมโม ปัสสาวะสีเข้ม(สีชา) เลือดออกง่ายกว่าปกติ หิวบ่อยลง
- ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ถ่ายปนเลือด อุจจาระมีสีดำหรือเหนียว ปวดท้องรุนแรง

- ปวดหัวแบบผิดปกติ เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวผิดปกติ หน้ามืดหรือเป็นลม หิวบ่อยหรือหิวมากกว่าปกติ ผม่วง อารมณ์ขึ้นลง นานา ท้องผูก เสียงทุ่มต่ำ ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
- กล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง ขาหรือเสียวที่ปลายมือปลายเท้า มีไข้ สับสนมึนงง อารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมแปรปรวน ไม่สู้แสง คอแข็ง
- ตาพร่า ภาพซ้อน หรือการมองเห็นผิดปกติ
- มีไข้ ไอ ปัสสาวะบ่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวดแสบขณะปัสสาวะ

### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- เหนื่อยง่าย
- อยากอาหารลดลง
- คลื่นไส้
- ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้
- ท้องผูก
- หายใจสั้น
- ไอ

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา
  - ชนิดสารละลายเข้มข้นสำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำสารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีด ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อนปริมาณ 840 มิลลิกรัม/14 มิลลิลิตร

หรือ 1200 มิลลิกรัม/20 มิลลิลิตร บรรจุในขวด  
แก้วใส

- ชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  
สารละลายไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อนปริมาณ 1875  
มิลลิกรัม/15 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้วใส
- **ตัวยาสำคัญ** ได้แก่ อะทิลโซลิซูแมม
- **ส่วนประกอบอื่นๆของชนิดสารละลายเข้มข้น**  
สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ ได้แก่  
แอล-ฮิสทีดิน เกลืออะซีติกแอซิด ซูโครส  
โพลิวอร์เบท20 และน้ำปราศจากเชื้อสำหรับฉีด
- **ส่วนประกอบอื่นๆของชนิดสารละลายสำหรับ**  
**ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง** ได้แก่ แอล-ฮิสทีดิน ไรคอม  
บีแนนท์ฮิวแมนไฮยาลูนิเดส อะซีติกแอซิด  
ซูโครส โพลิวอร์เบท20 แอล-เมไทโอนีน และ  
น้ำปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

#### **ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย:**

**ผู้ผลิตที่เชนทรีชนิดสารละลายเข้มข้นสำหรับ**  
**หยดเข้าหลอดเลือดดำ:**

บริษัท เอฟ ฮอฟมันน์ – ลา โรช จำกัด สวิสเซอร์แลนด์  
และ บริษัท โรช ไดแอ็กโนสติกส์ จำกัด เยอรมัน

**ผู้ผลิตที่เชนทรีชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้า**  
**ใต้ผิวหนัง:**

บริษัท โรช ไดแอ็กโนสติกส์ จำกัด เยอรมัน

**ผู้นำเข้า** บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ

**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด กรุงเทพฯ

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/pages/main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ใขยานี้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยา