

แล็กทูโลส
ความแรง 3.3 กรัม
ต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิด น้ำเชื่อม
ชื่อการค้า LACASAT (ลากาแซ็ต)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้ชื่อว่า แล็กทูโลส (lactulose) เป็นยาในกลุ่มยาระบาย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อเป็นยาระบายรักษาอาการท้องผูก
- ยานี้ใช้เพื่อลดระดับแอมโมเนียในเลือดของผู้ป่วยโรคตับที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าให้ใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีภาวะน้ำตาลกาแลคโตสในเลือดสูง
- ⊗ มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท้องผูกรุนแรง
 - ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ
 - มีการทำงานผิดปกติของ กระเพาะอาหาร ลำไส้ และหัวใจ
 - หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังให้นมทารก
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสียรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกินแม้จะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ใช้ยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดีจากการใช้ยา
- กินยาในเวลาทีใกล้เคียงหรือเวลาเดิมในทุก ๆ วัน
- ควรดื่มน้ำสะอาดระหว่างวันบ่อย ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันประมาณ 2 ลิตรต่อวัน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องอืด มีแก๊สในท้องเยอะ
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้นเช่นในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- การเก็บหลังเปิดใช้ เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำใส สีเหลือง
- ตัวยาสำคัญ แล็กทูโลส
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่มี

ผู้ผลิต

บริษัท โอสธ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
600/9 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท แคสป์า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
252/25 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>



เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร