

อาร์โมดาฟินิล

ความแรง 150, 250 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Nuvigil (นูวิจิล)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อาร์โมดาฟินิล (Armodafinil) มีตัวยา 150, 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มกระตุ้นความตื่นตัว

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ เพิ่มความตื่นตัวในผู้ที่มีภาวะง่วงนอน ในช่วงกลางวันมากเกินไปโดยเกี่ยวข้องกับภาวะทางการแพทย์ที่เรียกว่า ภาวะง่วงเกิน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น หรือ ความผิดปกติด้านการนอนอันเนื่องมาจากการทำงานเป็นกะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาโมดาฟินิล

- เมื่อตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
- มีประวัติปัญหาสุขภาพจิต
- มีปัญหาโรคหัวใจ เช่น ปวดเค้นหัวใจ เคยหัวใจวาย หัวใจโต
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ความดันโลหิตสูง หรือกำลังกินยาลดความดันโลหิต
- มีปัญหาโรคตับหรือไต

- ยานี้อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดกิน ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถ้าท่านกำลังกินยาคุมกำเนิด
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายานี้ และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ อาร์โมดาฟินิลหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนอาหาร เนื่องจากอาหารอาจรบกวนการออกฤทธิ์ของยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น กระสับกระส่าย หรือนอนไม่หลับให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าตั้งท้องระหว่างใช้ยานี้ ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที
- ถ้าท่านต้องเริ่มใช้ยาอื่นร่วมกับยานี้ ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรว่าท่านกำลังกินยาอาร์โมดาฟินิลอยู่
- แจ้งแพทย์ถ้าอาการป่วยของท่านไม่ดีขึ้น
- ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นกิน
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีไข้ หายใจสั้น ชาบวม ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม
- ซึมเศร้า วิตกกังวล ก้าวร้าว หงุดหงิด ประสาทหลอน ออยากฆ่าตัวตาย หรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชัก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หีบยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยาเม็ดรูปไข่ สีขาวถึงขาวนวล มีสัญลักษณ์ (C) บน เม็ดยาด้านหนึ่ง และ เลข 215 บนอีกด้านของเม็ดยา มีตัวยาอาร์โมดาฟินิล 150 มิลลิกรัม
- ยาเม็ดรูปไข่ สีขาวถึงขาวนวล มีสัญลักษณ์ (C) บน เม็ดยาด้านหนึ่ง และ เลข 225 บนอีกด้านของเม็ดยา มีตัวยาอาร์โมดาฟินิล 250 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบในตำรับ: แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, พรีเจลาตินไนซ์เมซสตาร์ช, โปวีโดน, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรท

ผู้ผลิต: Anesta LLC
UT, 84116, USA

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

