

**ดอร์โซลามีด ไซโตรคลอไร์ต  
20 มิลลิกรัม และ ทิโนโลล มาลีเอต  
5 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร  
น้ำยาหยดตา  
VISOPT-DT (วิสอพท์-ดีที)**

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดอร์โซลามีด ไซโตรคลอไร์ต และ ทิโนโลลมาลีเอต มีตัวยาดอร์โซลามีด ไซโตรคลอไร์ต 20 มิลลิกรัม และ ทิโนโลลมาลีเอต 5 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่ม ยาตา

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตา ในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมเปิด

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่ หรือส่วนประกอบของยาที่

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในการต่อไปนี้
  - เมื่อยอดยาหันที่ที่นิ่งขึ้นได้
  - ถ้าใกล้เวลาหยดตารอบถัดไปให้ข้ามครั้งที่ลืมและไม่ต้องหยดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้ายอดยาที่เกินขนาด ปริมาณน้ำยาส่วนเกินจะไหลออกนอกลูกนัยน์ตา
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาด ก่อนใช้ยา
- เงยหน้าขึ้น
- ใช้นิ้วมือดึงเปลือกตาล่างลงมาหยุดยา 1 หยดลงในกระพุงตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัส ตา หรือสิ่งอื่นใด
- หลบตาไว้ประมาณ 2 นาที
- หากต้องการหยดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น
- กรณีใช้ร่วมกับยาหยดตาชนิดอื่นให้หยดยาที่ ภายหลัง 5 นาที
- ยานี้มีส่วนผสมของสารกันเสียอาจทำให้เกิดการคายเคืองตาได้ ควรลดความแทรกเลนส์ก่อนใช้ยานี้และใส่คอนแทคเลนส์หลังใช้ยา 15 นาที

### 3.2 หากลืมหยดยาควรทำอย่างไร

- หยดยาหันที่ที่นิ่งขึ้นได้
- ถ้าใกล้เวลาหยดตารอบถัดไปให้ข้ามครั้งที่ลืมและไม่ต้องหยดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ายอดยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้ายอดยาที่เกินขนาด ปริมาณน้ำยาส่วนเกินจะไหลออกนอกลูกนัยน์ตา
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสดวงตาหรือสิ่งอื่นใด
- ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน
- ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าภาชนะบรรจยาถูกขาดก่อนที่จะเปิดใช้
- ไม่ควรขับรถ หรือทำงานโดยใช้เครื่องจักรจนกว่าตาจะมองเห็นได้ชัด

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คัน เดื่องตา ตาแห้ง ตาแดง มองเห็นภาพไม่ชัด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ ดอร์โซลามีด ไซโตรคลอไร์ต และทิโนโลลมาลีเอต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมซีเทรต, แมนนิทอล, เบนแซลโคลนิยมคลอไร์ต, ไซดรอกซีเอทิลเชลลูลอส, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด

1/38 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงคลองเจ็ต ต.นึงค่าพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
โทร. 02-9715335 แฟกซ์ 02-9715470

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 เมษายน 2565  
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>