

ลิวีโทราซีแอม
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า TIRATAM 500
(โทราแอม 500)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลิวีโทราซีแอม (Levetiracetam)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มอนุพันธ์ของไพริโรลิโดน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - ท่านเป็นโรคไต
 - บุตรของท่านโตช้า หรือมีพัฒนาการทางเพศผิดปกติ
 - เคยได้รับยากันชักแล้วมีอาการซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
 - ท่านกำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรอื่นร่วมด้วย
 - ท่านกำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- **ไม่แนะนำให้ใช้เป็นเวลาเดียวในการรักษาผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี**

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับการกินก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- ให้รีบแจ้งแพทย์ หากได้รับยาแล้วยังมีอาการชักอยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผื่นบนใบหน้าแล้วลุกลามตามลำตัว ร่วมกับมีไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต
- ปัสสาวะไม่ออก บวมที่ขา-ข้อเท้า น้ำหนักขึ้นเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
- อารมณ์แปรปรวน สับสน ง่วงนอนมากผิดปกติ หลงลืมเดินลำบาก มือสั่น

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- โพรงจมูกและคอหอยอักเสบ ปวดหัว
 - เบื่ออาหาร
 - ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิดกกังวล ตื่นกลัว หงุดหงิดง่าย
 - บ้านหมุน มึนงง
 - ปวดท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย อาเจียน
 - คลื่นไส้ ไอ
 - อาการแพ้
 - น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
 - ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อ มีความรู้สึกเป็นเหน็บ
 - ผมรั้ง อาการคันบนผิวหนัง
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดรูปรี หนุน เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งและอักษร EPL และตัวเลข 500 อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสสำคัญ** ลิวีโทราซีแอม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ โพลีเอทิลีนไกลคอล 6000 โพรพิลโดนแค 30 คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ ครอบคาร์เมลโลสโซเดียม แมกนีเซียมสเตียเรท ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โอปาตรายทุไวท์ ไททาเนียมไดออกไซด์ คิงเลคชันเซตเยลโล่ คิงเลคคิวโนลีนเยลโล่ คิงเลคทาร์ทราซีน และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด

1/18 หมู่ 4 แขวงบึงคำพร้อย

อำเภอสามโก้ จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2943-6366 แฟกซ์ 0-2943-6989

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ตุลาคม พ.ศ.

2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

1. ยานี้อาจทำให้วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมขณะใช้ยานี้อ
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้อในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้อในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต