

คีโทโรแล็ก

**ความแรง 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด**

ชื่อการค้า Ketromax (คีโทรแม็กซ์)

1. ยานี้คือยาอะไร**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า คีโทโรแล็ก (ketorolac) เป็นยากลุ่มแก้ปวดลดอาการอักเสบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อระงับอาการปวดหลังผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มต้านอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เอนเสด)
- มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
- เป็นโรคตับ หรือโรคไตอย่างรุนแรง
- เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองหรือหัวใจโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์
 - เป็นผู้สูงอายุ
 - เป็นโรคหัวใจ
 - มีความดันโลหิตสูง

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เหงื่อ ฆ่า ง่วงซึม คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้องให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากจำเป็นจะต้องกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมด้วย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้อง อาเจียนปนเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นสีดำหรือเลือดสด
- บัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อยลงกว่าปกติ บัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำโค้ก
- ความอยากอาหารน้อยลง สีตาขาวหรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
- ปวดหัวรุนแรง มือหรือขาตื้อด้านใดด้านหนึ่งชาหรืออ่อนแรง
- การมองเห็น การพูดหรือการเดินผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้

**ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกรหรือพยาบาลทันทีหรือ
กลับมาพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย เจ็บปวดในช่องท้อง แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ มีแผลเปื่อย อาเจียน
- มึนงง ง่วงซึม ปวดหัว

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลหรือกลับมา
พบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีตัวยาสำคัญ คือ คีโทโรแล็ก โทรมเมตามีน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียม คลอไรด์ เอทานอล โซเดียม ไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก และน้ำสำหรับยาฉีด
- ลักษณะของยาเป็น สารละลายใสไม่มีสีถึงสีออกเหลือง

ผู้ผลิต

บริษัท เช่าหยวน เคมี จำกัด เมืองเซี่ยฮี้ สาธารณรัฐไต้หวัน

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดี
รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มกราคม 2563

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**