

**เออร์โซดีออกซีโคลิคแอซิด**  
**500 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า Ursoliv 500**  
**(เออร์โซลิบ 500)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า เออร์โซดีออกซีโคลิคแอซิด (Ursodeoxycholic acid)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้ เพื่อรักษาโรคตับแข็งจากท่อน้ำดีอักเสบและละลายนิ่วในท่อน้ำดี

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ท่อน้ำดีหรือท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
- ⊗ ท่อน้ำดีอุดตัน
- ⊗ มีอาการปวดเสียดท้อง

- ⊗ นิ่วจากแคลเซียมซึ่งมีลักษณะทึบแสง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ผู้ป่วยหญิงให้ปรึกษาแพทย์เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
  - หญิงมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
  - กำลังใช้ยา อาหาร สมุนไพรบางชนิด เช่น ยาลดไขมัน ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ ยาปฏิชีวนะ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือเภสัชกรจะเป็นผู้แจ้งแก่ท่านว่าต้องกินยานี้ก่อนหรือหลังอาหาร

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลากินยาของมื้อถัดไป ให้ออกไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามค่าการทำงานของตับ ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ป่วยหญิงให้ใช้การคุมกำเนิดตามวิธีที่แพทย์แนะนำ

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดท้อง ท้องเสีย
- ผื่นคัน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- เม็ดยารูปรี สีขาว เคลือบฟิล์ม
  - ตัวยาสำคัญ ได้แก่ เออร์โซดีออกซีโคลิคแอซิด 500 มิลลิกรัม
  - ยานี้มีส่วนประกอบของ โพรโอดิน เค 30 โพลีซอร์เบต 80 ครอสโพรโอดิน ซิลิโคน ไดออกไซด์ ฟงทาลคัม แมกนีเซียม สเตียเรต น้ำมันสุทธิ สารเคลือบฟิล์ม โอปาดราย II คอมพลีท เคลียร์ 52U19258
  - ผู้ผลิต บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565**

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**