

**แอสซาไซทิดีน**  
**ความแรง 100 มิลลิกรัมต่อขวด**  
**ชนิดผงแห้งสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Azadual 100**  
**(เอซาซูดอล 100)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า แอสซาไซทิดีน (Azacitidine) เป็นยาในกลุ่มเคมีบำบัด

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้รักษาโรคไขกระดูกเสื่อม โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีโลโมโนไซติก และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ ในผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นมะเร็งตับระยะลุกลาม
- ⊗ กำลังให้นมลูก

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ในกรณีต่อไปนี้
  - มีอาการเลือดออกง่าย หรือมีจ้ำเลือด
  - เป็นโรคไต หรือโรคตับ
  - มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด
  - เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
  - มีการใช้ยาอื่นร่วมด้วย

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ

**3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร**

- หากลืมมารับยา หรือสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

**3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- คุมกำเนิดทั้งในเพศชายและหญิงระหว่างการรักษาด้วยยานี้ และหลังจากหยุดใช้ยานี้ไปแล้ว 3 เดือน
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้า

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ง่วงนอนมากผิดปกติ ตัวสั่น ตัวเหลืองตาเหลือง (ดีซ่าน) ท้องอืด เกิดรอยช้ำง่าย
- ขาและเท้าบวม ปวดหลัง ปัสสาวะน้อยลง กระหายน้ำ หัวใจเต้นเร็ว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน หรือไม่อยากอาหาร มีอาการสับสน กระสับส่าย อ่อนแรง
- เจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากร่วมกับมีไข้
- มีเลือดปนมากับอุจจาระ

**“หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

**คำเตือน : ยานี้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

**5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- ปวด บวม แดง ผื่นคัน ผื่นหนังเปลี่ยนสีบริเวณที่ฉีด
- ปวดหัว เวียนหัว นอนไม่หลับ
- มีจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง คัน
- ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดข้อต่อ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
- น้ำมูกไหล เจ็บในจมูก เจ็บคอ เลือดกำเดาไหล
- ไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด

**“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะยา ผงแห้งสีขาว บรรจุในขวดแก้วใส (vial)
- ตัวอย่างสำคัญ แอสซาไซทิดีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมนนิทอล

ผู้ผลิต บริษัท เอ็มเอสเอ็น แลบบอราทอรี ไพรเวต จำกัด, ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2565

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**