

**เจฟีทีนิบ**

**ความแรง 250 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด**

**ชื่อการค้า Gefitinib NIKP FC tab 250mg  
(เจฟีทีนิบ นิคพี ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 250 มก.)**

**1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อว่า เจฟีทีนิบ (Gefitinib) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา****2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งท้อง
- ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**

- แจ้งแพทย์ว่ากำลังใช้ยาใดบ้าง
- มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- มีประวัติโรคปอดหรือโรคตับ

**3. วิธีใช้ยา****3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลา กินตามขนาดของยาและคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร**อย่างเคร่งครัด**
- กินยานี้พร้อมอาหาร หรือตอนท้องว่างก็ได้
- ห้ามกินยาลดกรดภายใน 2 ชั่วโมงก่อนกินยานี้ หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยานี้

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แล้วกินเม็ดต่อไปตามปกติ
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของเม็ดต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัด**อย่างสม่ำเสมอ** ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรบริจาดเลือดระหว่างกินยานี้ และ 1 เดือนหลังจากหยุดกินยานี้
- ผู้หญิงที่กินยานี้ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งท้อง หากประจำเดือนขาดต้องรีบปรึกษาแพทย์
- หากกินยานี้แล้วง่วงนอน วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา****5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้าที่มืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดิบ
  - ท้องเสียรุนแรง
  - ปวดตา ตาแดง ตาแฉะ ตาแพ้แสง มองเห็นไม่ชัด
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ผิวแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผม่วง
- ตาแห้ง หรือคันตา

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- ควรเก็บยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ยาเจฟีทีนิบ นิคพี มีลักษณะเป็น ยาเม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีน้ำตาล มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ Gefitinib 250 NIKP ทั้งสองด้าน

**ส่วนประกอบในตำรับยา:**

**ตัวยาสำคัญ:** เจฟีทีนิบ 250 มิลลิกรัม

**สารปรุงแต่ง:** แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีน

เซลลูโลส, ครอสคาเมลโลส โซเดียม, โพรโตน, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, แมกนีเซียม สเตียเรต, น้ำ, สารเคลือบฟิล์มสีน้ำตาล (พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ชนิดไฮโดรไลซ์บางส่วน, แมโครกอล 4000, ทาลคัม, ไอเอิร์นออกไซด์สีเหลือง, เฟอริกออกไซด์ และไทเทเนียมออกไซด์) และหมึกพิมพ์เฟอริกออกไซด์

**ผู้ผลิต:** บริษัท ไดโคะ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ญี่ปุ่น

**ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:**

บริษัท นิซิโตะ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

**คำเตือน** ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้

ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 28 มีนาคม 2565**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**