

**โซฟอสบูเวียร์ 400 มิลลิกรัม และ
เวลพาทาสเวียร์ 90 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด**
ชื่อการค้า : เอปคลูซา (Epclusa®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยา 2 ชนิด คือ
 - โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) 400 มิลลิกรัม
 - เวลพาทาสเวียร์ (velpatasvir) 100 มิลลิกรัม
- ยานี้เป็นยาด้านไวรัสตับอักเสบบี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง (สายพันธุ์ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) ในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ร่วมกับ ยารักษาวัณโรคบางชนิด (เช่น ริแฟมพิซิน) ยารักษาโรคลมชักบางชนิด (เช่น คาร์บามาเซพีน เฟนิโทอิน ฟิโนบาร์บิทัล) สมุนไพรบางชนิด (เช่น เซนต์จอห์นเวิร์ต)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้**
 - กำลังตั้งครรภ์ หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมลูก เพราะยังไม่มีข้อมูลการขับออกยานี้ทางน้ำนม
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 - เป็นโรคไต ได้รับการล้างไต หรือ โรคตับชนิดอื่น หรือ เคยได้รับการปลูกถ่ายตับ
 - มีประวัติติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย เพราะอาจทำให้มีอาการตับอักเสบก้ำเรื้อรังได้
 - กำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น วาร์ฟาริน) เพราะแพทย์อาจต้องตรวจเลือดของท่านบ่อยขึ้น
 - เป็นโรคเบาหวาน เพราะอาจทำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

- **“ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้”**
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้** เช่น ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด (เช่น อะมิโอดาโรน ดิจอกซิน) ยาแก้ปวดบางชนิด (เช่น ออกซ์คาร์บาเซพีน) ยาด้านไวรัสเอชไอวีบางชนิด (เช่น เอฟาเวียเรนซ์ เทโนโฟเวียร์)

“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวอยู่หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร
- กลืนยาทั้งเม็ด ไม่ควรเคี้ยวหรือบดเม็ดยา เนื่องจากยาไม่รสขม
- หากกินยาลดกรด ให้กินห่างจากยานี้ โดยกินก่อนหรือหลังกินยาน้อยอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- หากกินยาขับยั้งการหลังกรด (เช่น โอมิเพราโซล) ให้กินยานี้พร้อมอาหาร ก่อนกินโอมิเพราโซล 4 ชั่วโมง
- หาก อาเจียนภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากกินยา ให้กินยานี้ใหม่อีกครั้ง

3.2 หากลืมกินยานี้ ควรทำอย่างไร

- ถ้า นึกได้ภายใน 18 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปตามปกติ
- ถ้า ลืมกินยาเกิน 18 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาเม็ดนั้น ให้รอกินยาของเม็ดต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด ห้ามหยุดยาเอง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

“ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น

- คลื่นไส้
- ท้องเสีย
- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดดแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย DCH Auriga (Thailand) Limited

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2563

หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยานี้ โปรดแจ้งแพทย์และผู้รับผิดชอบการวางจำหน่ายในประเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-3500) เพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**