

**นาลบูฟิน**

**ความแรง 10 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร**  
**ชนิดสารละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Nulphin Injection (นูลฟิน)**

**1. ยานี้คือยาอะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า นาลบูฟิน (Nalbuphine) มีตัวยา 10 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มระงับปวดโอปิออยด์

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้สั่งใช้โดยแพทย์เพื่อ

- บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
- บรรเทาปวดก่อน และหลังผ่าตัด
- บรรเทาปวดในระหว่างการคลอดบุตร

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา****2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มโอปิออยด์

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หายใจผิดปกติ
  - ค่าการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
  - หัวใจเต้นช้าลง
  - ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  - ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทางเดินน้ำดี
  - สตรีให้นมบุตร

**3. วิธีใช้ยา****3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ฉีดยาเข้าใต้ชั้นไขมัน ชั้นกล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำ

**3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง [เช่น รู้สึกตัวลดลง ซึมลง หหมดสติ] ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
- ระงับการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานกับเครื่องจักร เพราะเมื่อฉีดยานี้อาจทำให้ง่วงนอน
- ระงับการใช้ยานี้ร่วมกับยาโอปิออยด์อื่นๆ
- การหยุดยาอย่างฉับพลันภายหลังการใช้มานานอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา****5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง
- ซ็อก หายใจติดขัด หายใจล้มเหลว
- หัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว
- ความดันต่ำ หลอดเสียงบวม

หากมีอาการเหล่านี้

**ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

**5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- ง่วงซึม เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน มีนงง ปากแห้ง ปวดหัว
- ซึมเศร้า หดหู่ ร้องไห้ เคลิ้มฝัน หลอนประสาท
- ความดันสูง ใจเต้นเร็ว
- ปวดเกร็งในช่องท้อง อาหารไม่ย่อย รู้สึกขมในปาก
- หอบหืด พุดลำบาก ปวดปัสสาวะฉับพลัน มองเห็นไม่ชัดเจน ร้อนวูบวาบ

**"ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

- นํ้ายาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดใส ไม่มีสีถึงสีออกเหลือง
- ตัวยาสําคัญ นาลบูฟิน ไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แอนไฮดริส ซิตรีก เอซิด, โซเดียม คลอไรด์, โซเดียม ซิเตรด ไดไฮเดรต, กรดไฮโดรคลอริก, และนํ้าสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต

จีโนเวท ไบโอเทคโนโลยีส์ เมืองชินซู สาธารณรัฐไต้หวัน

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**