

ไมโคนาโซล

ขนาด 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กรัม

ชนิดเจลทาในปาก

ชื่อการค้า **Daktarin®** (ดาคทาริน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ดาคทาริน มีตัวยาไมโคนาโซล (miconazole) 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กรัม เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาเชื้อราในช่องปากและทางเดินอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาฆ่าเชื้อราในกลุ่มโอบิดาโซล (เช่น คีโดโคนาโซล)
- เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน
- ดื่มนมผง
- กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น ยาวาร์ฟาริน ยาลดไขมัน กลุ่มสแตติน (เช่น ซิมวาสแตติน) ยากลุ่มเออร์กอต อัลคาลอยด์ ยาไมตาโซแลม เป็นต้น

**“แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร
ทุกครั้งหากท่านกำลังใช้ยาอื่นอยู่”**

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอก แพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ใช้ยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องใช้อีกครั้งไม่ต้องใช้ยาที่ลืม

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไมนำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือมีอาการกลับมาเป็นซ้ำ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังทายา
- ในเด็กอายุ 4 เดือนถึง 2 ปี ใช้เจลครั้งละ 1/4 ช้อนตวง (1.25 มิลลิลิตร) ทาวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร โดยแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ และป้ายให้ทั่วบริเวณที่ติดเชื้อด้วยนิ้วมือที่สะอาด อย่าป้ายยาปริมาณมาก บริเวณส่วนหลังลำคอเพื่อป้องกันการสำลัก
- แนะนำให้ห่อมไว้ในปากให้นานที่สุด ไม่ควรกลืนยาทันที
- หากอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนม ห้ามทาเจลบริเวณหัวนมเพื่อรักษาลูก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหนัง
- ตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม ผิดปกติ ร่วมกับคลื่นไส้ ปวดท้องรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง เจ็บปาก ลิ้นรับรส ผิดปกติ

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะเป็นเจลสีขาว
- ตัวยาสำคัญ คือ ไมโคนาโซล
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แอลกอฮอล์ (Alcohol), สารแต่งรสโกโก้ (Cocoa flavor), กลีเซอรอล (Glycerol), สารแต่งรสส้ม (Orange flavor), แป้งมันฝรั่ง (Pregelatinized potato starch), โพลีซอร์เบท (Polysorbate), น้ำบริสุทธิ์ (Purified water), โซเดียมแซ็กคาริน (Sodium saccharin)

ผู้ผลิต Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, ประเทศเบลเยียม

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 1800-333-666 (โทรฟรียกเว้นโทรศัพท์มือถือ)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 20 มกราคม 2566
(CCDS version 23 November 2016)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ ระยะให้นมบุตร
3. ยานี้อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**