

ยาอะคินซิโอล
ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า อะคินซิโอล ประกอบด้วย เนทุพิตาเนต (netupitant) 300 มิลลิกรัม ผสมกับ พาโลโนเซตัน (palonosetron) 0.5 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่ หรือส่วนประกอบของยาที่
- ห้ามใช้ยาที่ในหญิงตั้งครรภ์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาที่ หากท่านมีภาวะดื้อไปนี้

- เป็นโรคตับ โรคไต
- เคยเป็นล้าไส้อุดตัน หรือท้องผูกเรื้อรัง
- เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นช้า
- มีระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- ควรหยุดให้นมบุตร และหยุดต่อไปถ้าอย่างน้อย 1 เดือนหลังใช้ยา

- ควรแจ้งแพทย์ หรือ เภสัชกรก่อนใช้ยาที่หากท่านใช้ยาด้านข้างเสริม หรือ ยาคลายกังวล不安 ชนิด เช่น ฟลูออกซิทิน พาร์อกซีทิน เขอร์ทรอล เวนลาฟازิน นอกจากนี้ยาอื่นๆ อาจมีผลต่อการรักษา จึงควรแจ้งแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนด้วย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามค่าแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร

- ให้กินยา 1 แคปซูล ก่อนให้เคมีบำบัดเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

- ยาที่กินตอนห้องว่าง หรือพร้อมอาหารก็ได้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ทันที หากกินยามากกว่า 1 แคปซูล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระวังภาวะร้าบขับปัสสาวะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เนื่องจากยาที่อาจทำให้ง่วงซึ้ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที

- แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก หน้ามืด เป็นลม
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น คอ กลืนลำบาก ลมพิษ
- ผื่นคัน ตุ่นพอง ผิวนองหลุดลอก ฉีดตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ หยุดยา
แล้วรีบแจ้งแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ต้องมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว ห้องผูก รู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้า

“หากมีอาการเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ต้องมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะยาและส่วนประกอบของยา

- แคปซูลเจลatinชนิดแข็งสีขาวขุ่นขนาด “0” สีขาว และสีคราเมล พิมพ์ตัวอักษร “HE1”
- ส่วนประกอบของยาที่ได้แก่ : ในโครงสร้างตัวลิสเซลลูโลส (วี460), ไซโคลอฟอร์, โพลิโอดีน เด-30, ครอสคาโรลล์โซล โซเดียม, คลอลอยต์ล ไซเดรต ซีลิกา, โซเดียม สเตียริล ฟูนาเรต, แมกนีเซียม สเตียริล, กลีเซอรอล โนโน คาพริโล卡拉ฟอเรต (ชนิด1), กลีเซอรอล, โพลิกลีเซอร์ล โอลีอีด, น้ำ, บิวทิลไไซดรอคิชีนโซไซล (วี320), เจลาติน, ชอร์บิทอล, 1,4 ชอร์บิทอน, ไทเทเนียม ไดออกไซด์ (วี171), เยลโล ไอรอน ออกไซด์ (วี172), เรด ไอรอน ออกไซด์ (วี172), เยลแล็ค กลาซ (พาเทียลลี เอสเทอโรฟาย), แบล็ค ไอรอน ออกไซด์ (วี172) และโพไรฟลีน ไกลคอล (วี1520)

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

ผู้ผลิต

Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited
Damastown Mulhuddart Dublin 15 Ireland.

ผู้นำเข้า

บริษัท บันดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 63 อาคารแอนด์พีทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1602/2-1604 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร