

**เอนเทกคาเวียร์
ความแรง 0.5 และ 1 มิลลิกรัม
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า GEPATIT
(จีพาทิต)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอนเทกคาเวียร์ (entecavir) เป็นยาในกลุ่มยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยา

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เดยแพ้ยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในการณ์ต่อไปนี้
 - ตื้อต่อยาลาภูมิคุ้น
 - เป็นโรคตับหรือโรคไต
 - ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
 - เดยรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
 - แพ้น้ำตาลน้ำ
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยัน ความปลอดภัย
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพาะอาจมีผลต่อการรักษา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา นี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาต่ำนี้มาก่อน สามารถินยาพร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้
- สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาลาภูมิคุ้นไม่ได้ผล และผู้ป่วยโรคตับชั้นรุนแรง ควรกินยาขณะท้องว่าง เช่น กินยา ก่อนอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากใกล้เวลาของเม็ดถัดไป ให้รอกินยาของเม็ดถัดไป โดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาต่อไปย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะการหยุดยาอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับปัสสาวะบ่อย หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง คุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนอง หรือเลือดออกผิดปกติ
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว นอนไม่หลับ ง่วงซึม
- คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องร่วง
“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ย่าให้ดอนและโดยตรง โดยหัวไว้ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ลักษณะยา : ยาเม็ดรูปกลม ปลายมน นุนหั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว

มีตัวยาสำคัญคือ เอนเทกคาเวียร์ มี 2 ความแรง

- ความแรง 0.5 มิลลิกรัม
ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “M” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “EA”

- ความแรง 1.0 มิลลิกรัม
ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “M” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “EB”

• ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูลอลิส, ครอสโพลิโคน, แอลก็อตสโนโนไซเดรต, แมกนีเซียมสเตรียเรท, ไททาเนียมไดออกไซด์, ไฮโดรเมลลอล, มาโคกรอล, โพลีซอร์เบท 80

ผู้ผลิต : Mylan Laboratories Limited
ประเทศไทย

ผู้นำเข้า : บริษัท เมดา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร