

ซีลีค็อกซิบ

ความแรง 200 และ 400 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Celebrex™ (ซีลีเบริกซ์™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซีลีค็อกซิบ (celecoxib) เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดตีตยัด โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
- เพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- X เคยแพ้ยานี้ แพ้ส่วนประกอบของยานี้ แพ้แอสไพริน หรือแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น
- X เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
- X มีแผลเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
- X เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- X เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
- X เพิ่งผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
- X เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
- X มีแผลทะลุที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น
- X กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก
- X เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ผลิต: Pfizer Pharmaceuticals LLC
ประเทศเปอร์โตริโก

ผู้นำเข้า บ. เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 04 สิงหาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
 - ความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่
 - มีอาการบวมหน้า
 - มีการสูญเสีย น้ำ เช่น ท้องเสีย กินยาขับปัสสาวะ
 - กำลังรักษาโรคติดเชื้อ เพราะยานี้อาจบดบังอาการไข้
 - เป็นโรคตับหรือไตทำงานผิดปกติ
 - อายุมากกว่า 65 ปี
 - เป็นผู้สูงอายุที่น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม
 - วางแผนจะตั้งท้อง
 - แพ้น้ำตาลนม
 - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- “หากมีภาวะเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกิน อีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยง ให้ตับและไตทำงานผิดปกติ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงงได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการมึนงง หรือมองเห็นผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ มีอาการคล้ายหวัด
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
 - เจ็บเค้นหน้าอกรุนแรง
 - ปวดท้องรุนแรง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มึนงง ปวดหัว
 - ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
 - ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้องอืด แสบท้อง
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ารุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง ควรเก็บในที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**
ขนาด 200 มก.: แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเหลืองทอง ที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข “7767” และ “200” สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกสี เหลืองอ่อน
ขนาด 400 มก.: แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเขียวที่ ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข “7767” และ “400” สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกสี เหลืองอ่อน
- **ตัวยาสำคัญ** ซีลีค็อกซิบ (celecoxib)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แลคโทสโมโนไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์, โปวีโดน, ครอสคาเมลโลส โซเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรต