

**อะบิราเทอโรน**  
**ความแรง 250 มิลลิกรัม**  
**ชนิด-เม็ด**

**ชื่อการค้า ABIRATERONE 250 EURODRUG**  
**(อะบิราเทอโรน 250 ยูโรดรัก)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าอะบิราเทอโรน **250 ยูโรดรัก (Abiraterone 250 Eurodrug)** มีตัวยาอะบิราเทอโรน **อะบิราเทอโรน 250 มิลลิกรัม** เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามในผู้ชาย โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
- ⊗ ดับมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ
  - ดับมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติ
  - ความดันเลือดสูง
  - เป็นโรคหัวใจ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือด
  - โพแทสเซียมในเลือดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือด
  - หัวใจเต้นผิดปกติ หรือหัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก
  - นำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ
  - เท้า ข้อเท้า หรือขา บวมผิดปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
  - เคยใช้ยาชื่อ "คีโตโคนาโซล" ในการรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก
  - น้ำตาลในเลือดสูง

- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน หากจะใช้ยาสมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ

**3. วิธีใช้ยา**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้กินครั้งละ 4 เม็ด วันละหนึ่งครั้ง ตอนท้องว่าง ห้ามกินยาพร้อมอาหาร โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลนตามที่แพทย์สั่ง
- กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ให้กลืนยาทั้งแคปซูลเม็ด พร้อมน้ำเปล่า ห้ามแบ่ง เคี้ยวหรือบดเม็ดยา

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากลืมกินยา ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า
- หากลืมกินยานี้ หรือลืมกินยาเพรดนิโซโลนเกินกว่า 1 วัน ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นผิดปกติจุกหวนะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ ร่วมด้วย ในกรณีมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- สังเกตอาการผิดปกติที่เกิด หากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากบางอาการอาจไม่ถูกระบุหรือรายงานมาก่อน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน หากจะใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ Move to 2<sup>nd</sup> column

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นผิดปกติ

**"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ขาบวม เท้าบวม ท้องเสีย ความดันโลหิตสูง
- ปัสสาวะ แสบขัด ปัสสาวะบ่อยแต่น้อย ปัสสาวะไม่สุด ปวดท้องน้อยขณะปัสสาวะ

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดสีขาว รูปทรงรี ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "A" และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "250"

- **ตัวยาสำคัญ** อะบิราเทอโรน อะซีเตท 250 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, แลคโตส-โมโนไฮเดรต, โพรโตน, โซเดียม-ลอริล-ซัลเฟต, ครอสคาร์เมลโลส-โซเดียม, คอลลอยด์ดัล-ซิลิโคน-ไดออกไซด์, แมกนีเซียม-สเตียเรต

ผู้ผลิต ไอแซน ดรัก รีเสิร์ช โซลูชัน จำกัด, อินเดีย  
ผู้นำเข้า บริษัท แปซิฟิก เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
กรุงเทพฯ โทร. 02-881-2488

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน**

**พฤษภาคม 2563 2565**

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>