

พิก็อกลิทาโซน ความแรง 15, 30 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้า PIOGOX (พิก็อกอกซ์)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
 - ยานี้มีชื่อว่าพิก็อกลิทาโซน (Pioglitazone) เป็นยาในกลุ่มไทโอะโซลิดินไดโอน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
 - ยานี้ใช้ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้รับประทานเพียงอย่างเดียวหรืออาจใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลชนิดอื่น เช่น ซัลโฟนิลยูเรีย, เมทฟอร์มิน หรือยาฉีดอินซูลิน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
 - ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ⊗ เป็นโรคหรือมีประวัติหัวใจล้มเหลวระดับ 1-4
 - ⊗ มีภาวะการทำงานของตับบกพร่อง
 - ⊗ เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะคีโตซิส
 - ⊗ เป็นโรคหรือมีประวัติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 - ⊗ มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
 - ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - อาจจะทำงหรือกำลังวางแผนที่จะท้อง
 - อยู่ในระยะให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาเจมิไฟโบรซิลอย์
 - ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ขนาดยาเริ่มต้น 15 หรือ 30 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 45 มิลลิกรัมต่อวัน
 - กินยาวันละ 1 ครั้งพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้
- #### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

- #### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีสภาวะเป็นเลือด กล้ามเนื้อสลายไม่อยู่ ปวดเวลาปัสสาวะ ปวดหลัง หรือปวดท้อง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- ยานี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- #### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - หากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด กล้ามเนื้อสลายไม่อยู่ ปวดเวลาปัสสาวะ ปวดหลัง หรือปวดท้อง
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

- #### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หายใจลำบาก หงุดหงิดง่าย นำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเกิดอาการบวม
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา เป็นยาเม็ด มี 2 ความแรง ดังนี้
 - พิก็อกอกซ์ 15: ยาเม็ดรูปกลมแบน สีขาว เรียบทั้งสองด้าน
 - พิก็อกอกซ์ 30: ยาเม็ดรูปกลมแบน สีขาว ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - **ตัวยาสําคัญ** พิก็อกลิทาโซน
 - **ส่วนประกอบอื่นๆ** ไตแท็ก ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, โมโครคริสทัลลีนเซลลูโลส พีเอช 101, แล็กโทสโมโนไฮเดรต, โพลีซอร์เบต 80, แมกนีเซียมสเตียเรต, คอลลอยด์ดอล ซิลิคอน ไดออกไซด์, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต
 - **ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย** : บริษัท มิลลิเมด จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2563**

- **ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
 - <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร