

ชิลีค็อกซิบ

200 และ 400 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Celebrex™ (ชิลีเบริกซ์™)

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะไร
 - ยานี้มีชื่อว่า ชิลีค็อกซิบ (Celecoxib)
- ยานี้ใช้เพื่ออะไร
 - เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้ออักเสบ
 - โรคข้ออักเสบข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน โรคข้ออักเสบเรื้อรัง
 - เพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
 - เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่
 - เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือ แอสไพริน
 - เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
 - หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
 - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 - เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
 - เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง หรือโรคหลอดเลือดสมอง
 - เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
 - ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจในระยะหลังผ่าตัดใหม่ ๆ
 - มีผลทดสอบการแพ้ยาหรือแพ้สารก่อภูมิแพ้ส่วนต้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์

หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ

http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx

http://ndi.fda.moph.go.th/

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อายุมากกว่า 65 ปี
- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
- เป็นโรคตับ หรือไตทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง
- สูบบุหรี่ หรือมีอาการบวม (น้ำคั่งในร่างกาย)
- เป็นโรคหัวใจ
- วางแผนจะตั้งครรภ์
- มีการสูญเสียยา เช่น ไม่สบายและท้องเสียรับประทานยาขับปัสสาวะ
- กำลังได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ เนื่องมาจากยาชิลีเบริกซ์ อาจบดบังอาการใช้ซึ่งเป็นอาการแสดงของการติดเชื้อได้
- ผู้ที่มีประวัติการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ร้ายแรง เช่นปฏิกิริยาจากยาร่วมกับภาวะที่ไม่มีเลือดออกขาวชนิดอีโอซิโนฟิลในเลือดสูงและอาการต่าง ๆ ของระบบร่างกาย (กลืนอาการ DRESS)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

กินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

กินยาที่ลืมทันทีทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม

ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล

พรอมยามหรือภาวะรุนแรงทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเข้า

- ไม่แนะนำให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นที่โรคหรือมีอาการเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างการเข้ายา เพราะอาจเพิ่มความเสียหายต่อไตทำงานผิดปกติ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงงได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการมึนงง หรือมองเห็นผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ มีอาการคล้ายหวัด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- เจ็บค่อนหน้าอกรุนแรง
- ปวดท้องรุนแรง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
- อาเจียนเป็นเลือด อจากระสีตา

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีง่วง ปวดหัว
- ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบขับถ่ายผิดปกติ
- ท้องอืด แสบท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว และเก็บให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยาขนาด 200 มก.: แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเหลืองทองที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข "7767" และ "200" สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกสีเหลืองอ่อน
- ขนาด 400 มก.: แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเขียวที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข "7767" และ "400" สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกสีเหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ ชิลีค็อกซิบ (Celecoxib)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ lactose monohydrate, sodium lauryl sulfate, polyidone, croscarmellose sodium และ magnesium stearate

ผู้ผลิต: Pfizer Pharmaceuticals LLC

ประเทศไทย: โทริโก

ผู้แบ่งบรรจุ/ผู้ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย: Pfizer manufacturing Deutschland GmbH ประเทศไทย

ผู้นำเข้า: บ. อีพจอร์น (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 16 เมษายน 2564