

โลนอคโตคอก แอลฟา ชนิดผงพร้อมตัวทำละลายสำหรับฉีด ชื่อการค้า AFSTYLA® (แอฟสไตลา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
ยานี้มีชื่อว่า โล-นอค-โต-คอก-แอล-ฟา (lonoctocog alfa) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้เลือดแข็งตัว (แฟคเตอร์ 8) จัดอยู่ในกลุ่มยาควบคุมภาวะเลือดออก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้สำหรับรักษาและป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ เพราะเกิดจากการขาดปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัวชนิดที่แปดตั้งแต่กำเนิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - เคยแพ้โปรตีนของหนูแฮมสเตอร์
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ปรึกษาแพทย์ หากท่านคิดว่าขนาดยาที่ได้รับไม่สามารถควบคุมภาวะเลือดออกได้
 - หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้ง
 - ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่น
 - เคยได้รับยาที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวชนิดที่แปด (แฟคเตอร์ 8)
“แจ้งแพทย์ทราบทุกครั้ง”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ความถี่ในการให้ยาเป็นอย่างไร**
- แพทย์จะพิจารณาขนาดและระยะเวลาในการให้ยาให้แก่ท่านโดยพิจารณาจากชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ยานี้ให้โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ เท่านั้น ต้องให้โดยแพทย์หรือพยาบาล ท่านหรือบุคคลอื่นจะให้ยาเองได้ต้องผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีเท่านั้น
- 3.2 หากลืมรับยาตามกำหนดควรทำอย่างไร**
- ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้
- 3.3 ถ้าได้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- หากได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- บันทึกการใช้ยา** ทุกครั้งที่มีการใช้ยานี้ ได้แก่ วันที่ใช้ยา เลขรุ่นการผลิต และขนาดยาที่ได้รับ
- ห้ามหยุดยาเอง** ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามผลการรักษาและผลจากยา
- สังเกตอาการผิดปกติ** เช่น หากใช้ยาแล้วเกิดภาวะเลือดออกต่อเนื่อง ให้ปรึกษาแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือไปพบแพทย์ทันที**
- อาการแพ้ยา ลมพิษ ผื่นผิวหนัง
 - หน้ามืด แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด
 - ความดันต่ำ หายใจลำบาก
 - ใช้ยาแล้วเกิดภาวะเลือดออกต่อเนื่อง
- 5.2 อาการที่**เกิดได้บ่อย** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- อาการแพ้ยา
 - อาการมีนงง
 - อาการชา
 - ผื่น
 - ไข้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บขวดยาไว้ในกล่องเพื่อให้พ้นจากแสง
- ควรเก็บในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2- 8 องศาเซลเซียส), ห้ามแช่แข็ง
- ยาที่ผสมแล้ว ควรใช้ทันที
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก.

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยานี้มีตัวยาสาคัญ คือ โล-นอค-โต-คอก-แอล-ฟา
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แอล-ฮีสทีดิน, โพลีซอร์เบท 80, แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์, ซูโครส
- ใน 1 กล่องประกอบด้วย ตัวยาส่งสีเหลืองอ่อนจนถึงขาว และมีน้ำกลั่นสำหรับฉีดเป็นตัวละลาย
- ยานี้มี 5 ขนาด ได้แก่ 250, 500, 1000, 2000 และ 3000 ใอายุ

นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 มิถุนายน 2562