

**เมซาลาซีน ความแรง 500 มิลลิกรัม  
ยาเม็ดเคลือบชนิดละลายในลำไส้เล็ก  
ชื่อการค้า MECOLZINE 500 MG  
(มีโคลซีน 500 มิลลิกรัม)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าเมซาลาซีน (mesalazine)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ใช้รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลที่มีอาการกำเริบ และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
- ใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้แอสไพรินหรือยาอื่นในกลุ่มซาลิไซเลท
- เป็นโรคตับหรือโรคไตชนิดรุนแรง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง
  - มีประวัติโรคปอด โรคหอบหืด
  - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
  - อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอ
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - ยาคุมกำเนิด เช่น อะซาไรโอพรีน
  - ยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางชนิด เช่น วอร์ฟาริน

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 3 ครั้ง เข้า กลางวัน เย็น โดยกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด พร้อมดื่มน้ำตามมาก ๆ ห้ามตัดเคี้ยว หรือบดเม็ดยา

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของรอบถัดไปแล้ว ให้รอกินยาในรอบถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปวดท้อง ปวดหัวรุนแรง หายใจติดขัด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง
- ให้กินยาต่อเนื่องจนหมด แม้มิมีอาการ
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตะคริว ปวดท้องอย่างรุนแรง
- ไข้ ปวดหัวอย่างรุนแรง

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแพ่งก่อนเพราะยาอาจเสียได้
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดทรงรี เคลือบฟิล์มสีส้ม
- **ตัวยาสำคัญ** 500 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต แอนไฮดริส, โกลซีน, เซลลูโลสไมโครคริสตัลไลน์, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, ซิลิกา คอลลอยดอล แอนไฮดริส, แคลเซียมสเตียเรต, โปวีโดน (เค-30), ทัลก์, ไททาเนียมไดออกไซด์ (อี-171), เมททาโคลลิคแอซิด เอทิลอะซิเลต (1:1), แมคโครกอล 6000, เยลโล่เฟอริคไดออกไซด์ (อี-172), เรด เฟอริคไดออกไซด์ (อี-172), ไดบิวทิลเซบาเคต, เมททาโคลลิคแอซิด เมทิลอะซิเลต (1:1), เมททาโคลลิคแอซิด เมทิลอะซิเลต (1:2), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ผู้ผลิต FAES FARMA, S.A., Spain

ผู้นำเข้า บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565**

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>