

**1.3.1.3.1 กลาทิราเมอร์อะซีเตต
ความแรง 40 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Copaxone (โคเพ็คซอน)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยาที่รักษาโรครูปคลอกประสาทเสื่อมแข็งที่เป็นชา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาที่รักษาโรครูปคลอกประสาทเสื่อมแข็งที่เป็นชา

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เด็กแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา


- แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- แจ้งแพทย์ ถ้าเป็นโรคไตหรือโรคหัวใจ
- แจ้งแพทย์ ถ้าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี
- แจ้งแพทย์ ถ้ากินยาอื่นร่วมด้วย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกสช กรณ์เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา นี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยา 1 หลอดใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
- หลังจากเปิดฝา ห้ามจับเข็มฉีดยาเพื่อป้องกันการ ปนเปื้อน
- วิธีฉีด
 - ดึงหลอดฉีดยาออกจากกล่อง เตรียมสำลีชุบ แลกอกรอส์หนึ่งแผ่น สำลีธรรมดาวางนิ่งแผ่น และ ภาชนะสำหรับทิ้งของมีคม
 - ตรวจสอบหลอดฉีดยา ถ้ามีผงหรือตะกอนใน น้ำยา หลอดฉีดยาควรถูกหัก หรือหมดอายุให้ นำไปศีนโรงพยาบาล

- วางแผนฉีดยาไว้ 20 นาทีให้หายเย็นลง ห้าม ตากแดดหรือโดนความร้อน
- ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
- เลือกตำแหน่งฉีดยา เช่น หน้าท้อง หน้าขา ต้น แขนด้านหลัง สะโพก



- ห้ามนีดข้าวที่เดิม เพื่อลดป่วยเรื้อรังที่นีด ห้ามนีด ยาผ่านเสื้อผ้า ห้ามนีดยาบนบริเวณที่ผิวน้ำนมผิดปกติ เช่น ผิวเปลี่ยนสี หนังแข็งเป็นไถ หรือป่วย
- ทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดยาด้วยสำลีชุบ และกอกรอส์ รอ 10 วินาทีเพื่อให้แห้ง
- ดึงฝ่าเข็มออก
- ฉีดยาเข้าได้ผิวน้ำนมจนหมด
- ทิ้งหลอดฉีดยาลงในภาชนะที่เตรียมไว้

3.2 หากล้มฉีดยาควรทำอย่างไร

ให้ฉีดทันทีที่นีกได้แล้วไม่ต้องฉีดยาของวันถัดไป ห้าม ฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าฉีดยาเนื้อกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร ให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้ามีเลือดออกตรงที่ฉีดยาให้เอาสำลีกดห้ามเลือด หรือใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
- ห้ามนวดหรือคัลลิงบริเวณที่ฉีดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำนมหลุดลอก มีจ้ำดามผิวน้ำนม หรือเลือดออกผิดปกติ
- ชัก
- เป็นลม
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- หน้าแดง
- ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
- ติดเชื้อ มีไข้หวัด
- ชีบเครว่า การพูดผิดปกติ กลืนลำบาก
- เห็นภาพซ้อน การมองเห็นและการได้ยิน ผิดปกติ
- ปวดหัว ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดคอ
- อาเจียน
- ระคายเคือง แดง ป่วย คัน บวม อักเสบบริเวณ ที่ฉีด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาเนื้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทิ้งไว้ในครัวเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ห้ามแข็งแข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อน หรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาไว้หันมือเด็ก

1.3 ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- 1.3.1 PIL COPACONE • หลอดฉีดยาพร้อมใช้บรรจุสารละลายใส่ตัวยาสำคัญ กลาทิราเมอร์อะซีเทต 40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร • ส่วนประกอบอื่นๆ แม่นนิทอลและน้ำ

ผลิตโดย บริษัท นอร์ตัน เยลท์แคร์ ลิมิเต็ด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

นำเข้าโดย บริษัท เทวา พาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

9 ตุลาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร