

# ทาลาโซพาริบ ความแรง 0.25 และ 1 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูลแข็ง ชื่อการค้า TALZENNA (ทาลเซนนา)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทาลาโซพาริบ (Talazoparib) มีตัวยา 0.25 มิลลิกรัมและ 1 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยารักษา มะเร็ง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่แพทย์ตรวจแล้ว ว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร:

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไต
- หากท่านสามารถตั้งครรภ์ได้ บุคลากรทางการแพทย์ อาจทำการตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนที่ท่านจะเริ่มการรักษาด้วยทาลเซนนา
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาทาลเซนนา วันละ 1 ครั้ง
- สามารถกินยาทาลเซนนาพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้

- กลืนทาลเซนนาทั้งแคปซูล โปรดยาละลายหรือเปิดแคปซูลของทาลเซนนา
- บุคลากรทางการแพทย์อาจเปลี่ยนขนาดยาหรือแจ้งท่านให้หยุดใช้ยา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านตอบสนองต่อการรักษา มากน้อยเพียงใด

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

หากท่านลืมกินยาทาลเซนนาหรืออาเจียน โปรดกินยาครั้งถัดไปตามเวลาปกติ ห้ามกินยาเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ป่วยที่รู้สึกอ่อนล้า/มีอาการอ่อนเพลีย หรือมีนงงในขณะที่ใช้ทาลาโซพาริบควรใช้ความระมัดระวังเมื่อขับขี่หรือใช้งานเครื่องจักรกล
- หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ทาลเซนนาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ของท่านและอาจทำให้แท้งได้
  - ท่านไม่ควรตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยทาลเซนนา
  - โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบในทันที หากท่านตั้งครรภ์หรือเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยทาลเซนนา
- สตรีที่สามารถตั้งครรภ์ได้ ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างที่รักษาด้วยทาลเซนนาและเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 7 เดือน หลังจากที่กินยาทาลเซนนาครั้งสุดท้าย โปรดขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับรูปแบบของการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับท่าน

- ชายที่มีคูครองเป็นสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสามารถตั้งครรภ์ได้ ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาด้วยทาลเซนนาและเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 4 เดือน หลังจากที่กินยาทาลเซนนาครั้งสุดท้าย
- หากท่านกำลังอยู่ระหว่างให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมบุตร ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทาลเซนนาผ่านไปยังน้ำนมแม่หรือไม่
  - โปรดอย่าให้นมบุตรในระหว่างที่รักษาอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากกินยาครั้งสุดท้าย
  - โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการให้นมบุตรของท่านในระหว่างช่วงเวลานี้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวซิดหรือหัวใจเต้นเร็ว บัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือดจ้ำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะอย่างผิดปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ผม่วงปวดศีรษะ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

ทาลเซนนาอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ในเพศชาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีบุตรได้ในเพศชาย โปรดขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์หากท่านมีความกังวลในประเด็นนี้

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

PIL Revision no: 1.1

PIL date: January 11, 2021

Country: Thailand

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**  
ความแรง 0.25 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลอดภัย แคปซูลสีขาวขุ่น (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์ "TLZ 0.25" สีดำ)  
ความแรง 1 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลอดภัย แคปซูลสีแดงอ่อน (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์ "TLZ 1" สีดำ)
- **ตัวยาสำคัญ** ทาลาโซพาริบ ทอซีเลท
- **ส่วนประกอบอื่นของเม็ดยา** ได้แก่ Silicified microcrystalline cellulose (SMCC) (ซิลิซึฟไฟด์ ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส)

### ผู้ผลิต

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium

ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เอกสารฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้าย

ในวันที่ 11 มกราคม 64

### ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้

ต้องใช้อย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**