

เล็มโบเร็กซ์แซนท์

ความแรง 5 และ 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า DAYVIGO (เดวิโก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เล็มโบเร็กซ์แซนท์ (Lemborexant) มีตัวยา 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังได้รับยาบางชนิดเช่น ไอทรานโดรนาโซน คลาลิโทรไมซิน ฟลูโคนาโซน เวอราปามีล ไรแฟมปีน คาร์บามาซีน เอฟลาไวเรน
- ⊗ ผู้ที่เป็นโรคลมหลับ โดยต้องได้รับวินิจฉัยจากแพทย์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ที่กำลังมีและเคยมีภาวะตับบกพร่อง
 - ผู้ที่เคยมีภาวะไตบกพร่องรุนแรง
 - ผู้ที่เคยมีความผิดปกติของสมอง สภาพจิตใจ
 - ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 - ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 - กำลังตั้งท้องหรือมีแผนตั้งท้อง
 - กำลังให้นมลูกหรือมีแผนให้นมลูก
 - กำลังใช้สมุนไพรหรือยาที่กำลังใช้
- ผู้ที่ได้รับเครื่องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
- ไม่ควรใช้ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาในขนาด 5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ทันทีก่อนเข้านอน

- หลังกินยา ควรนอนอย่างน้อย 7 ชั่วโมง
- ไม่ควรเกิน 10 มิลลิกรัม ต่อวัน
- ไม่ควรกินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาในมือถัดไป

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยานี้อาจกระตุ้นให้เกิดการง่วงซึม หมดระวังในผู้ที่ขับชียานอนยันต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - สามารถเดิน ขับรถ กินข้าว โทรมศัพท์คุย หรือทำกิจกรรมใดๆ ขณะตื่นไม่เต็มที่
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม
- ปวดศีรษะ
- รู้สึกไม่สบาย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

เดวิโก 5 มิลลิกรัม เม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลมมนทั้งสองด้าน สีเหลืองอ่อน มีตัวอักษร “LEM” อยู่บนด้านหนึ่งและตัวเลข “5” อยู่บนอีกด้านหนึ่งของเม็ดยา

เดวิโก 10 มิลลิกรัม เม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลมมนทั้งสองด้าน สีส้ม มีตัวอักษร “LEM” อยู่บนด้านหนึ่งและตัวเลข “10” อยู่บนอีกด้านหนึ่งของเม็ดยา

• ตัวยาสำคัญ Lemborexant

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Lactose monohydrate (แล็กโทส), Low-substituted hydroxypropyl cellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลสที่มีน้ำหนักเบา), Hydroxypropyl cellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส), Purified water (น้ำบริสุทธิ์), Magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท), OPADRY® 03F42222 YELLOW (โอปาไดร 03F42222 สีเหลือง), OPADRY® 03F43101 ORANGE (โอปาไดร 03F43101 สีส้ม)

ผู้ผลิต Eisai Manufacturing Limited, United Kingdom

ผู้นำเข้า บริษัท เอไอซี (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท เอไอซี (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน:

1. ยานี้ทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับชียานอนยันต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
2. การใช้ยานี้อาจทำให้ติดเป็นนิสัยได้ ให้ใช้ตามแพทย์สั่ง
3. ไม่ควรดื่มสุรา เครื่องดื่ม หรือยาที่มีแอลกอฮอล์