

**โอฟล็อกซาซิน  
ความแรง 0.3%  
ชนิดขี้ผึ้งสำหรับป้ายตา  
ชื่อการค้า Tarivid Ophthalmic  
Ointment  
(ทาริวท ชนิดขี้ผึ้งสำหรับป้ายตา)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า โอฟล็อกซาซิน มีตัวยา 0.3% เป็นยาในกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ตาเช่น เปลือกตาอักเสบ ถุงน้ำตาอักเสบ ต่อมไขมันของหนังตาอักเสบ (ตาถุงยิง) เยื่อตาขาวอักเสบ แผ่นแกนหนังตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ แผลที่กระจกตา และใช้ระหว่างการผ่าตัดดวงตา
- ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**

- แฉงแพทย์ ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง แล้วป้ายยาป้ายตาเข้าไปในกระพุ้งขอบตาล่าง **ไม่ควรให้** ปลายหลอดยาสัมผัสกับมือและดวงตาขณะใช้ยา จากนั้นหลับตาแล้วคลึงหนังตาเบาๆ ให้ยากระจายทั่วตา
- ป้ายตาข้างที่เป็น วันละ 3 ครั้ง เข้า กลางวัน เย็น หรือตามคำแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกร

**3.2 หากลืมป้ายยาควรทำอย่างไร**

- ป้ายตาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาป้ายตาครั้งต่อไป ให้รอป้ายตาครั้งต่อไป

**3.3 ถ้าป้ายยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ควรป้ายตาอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ระมัดระวัง ในการขับชี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักรกล เพราะยาป้ายตาจะทำให้มองเห็นไม่ชัด

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนักหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เยื่อตาอักเสบ กระจกตาผิดปกติ รวมถึงกระจกตาอักเสบเห็นเป็นจุด

**"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ตาแดง ปวดตา ระคายเคืองตา

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ปิดฝาหลอดให้สนิท และเมื่อเปิดใช้แล้ว **ไม่ควรเก็บ** ยาไว้เกิน 1 เดือน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- หลอดอะลูมิเนียม บรรจุยาขี้ผึ้งสำหรับป้ายตา สีเหลืองอ่อน หลอดละ 3.5 กรัม
- **ตัวยาสาคัญ** โอฟล็อกซาซิน 0.3%
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ลาโนลิน, พาราฟินเหลว และปิโตรเลียมเจลลี่

**ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย**

ผลิตโดย บริษัท ชันเท็น ฟาร์มาซูติคัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

นำเข้าโดย บริษัท ชันเท็น (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**